

Treats up to
5,000
Sq.Ft.

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

COMPLETE INSECT KILLER

For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules¹

PROTECTS YOUR LAWN FROM TOP TO BOTTOM

**Kills Listed Surface Insects
in 24 Hours**

**Kills Listed Soil Insects
for up to 3 Months**

Kills listed pests on residential lawns, in and around flower beds, ornamental plantings and around the outside of homes. Intended for residential use.

Active Ingredients:
Bifenthrin*.....0.058%
Carbaryl.....2.300%
Other Ingredients.....97.642%
Total.....100.000%

*Cis isomers 97% minimum, trans isomers 3% maximum

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional
precautionary statements

EPA Reg. No. 9198-234-92564
Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (77) = 070989-MO-001 (79) = 5905-GA-01
(89) = 9198-AL-01 (68) = 67572-GA-1 (36) = 9198-OH-1M (93) = 9198-OH-2B (46) = 5905-LA-01



Mata los insectos de la superficie de la lista en 24 horas
Mata los insectos del suelo de la lista hasta por 3 meses

¹Except for harvester, pharaoh & carpenter ants

TREATS UP TO
5,000 Sq Ft
NET WT 11.5 Lb (5.2 kg)



COMPLETE BRAND INSECT KILLER

For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules I

QUICK FACTS

- **Kills ants^{**}, fleas, ticks, cutworms, chinch bugs, mole crickets & other listed pests**
- **Kills listed surface and foliage feeding pests** • **Kills listed insects above & below ground**
- **Kills listed surface insects in 24 hours** • **Kills listed soil insects for up to 3 months**
- **Use on lawn, ornamentals and around the outside of homes**

For questions or comments, call toll-free 1-877-229-3724 or visit our website at www.BioAdvanced.com

FIRST AID + Carbaryl is an N-Methyl Carbamate Insecticide.

IF SWALLOWED Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to by a poison control center or doctor. Do not give anything to an unconscious person.

IF ON SKIN OR CLOTHING Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contacts lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **You may also contact 1-800-757-8951 for emergency medical treatment information.**

ANTIDOTE STATEMENT: ATROPINE SULFATE IS HIGHLY EFFECTIVE AS AN ANTIDOTE. See NOTE TO PHYSICIAN.

Note to Physician: Carbaryl is an N-methyl carbamate that inhibits cholinesterase. Atropine is antidotal. Do not use 2-PAM (pyridine-2-aldoxime methiodide), opiates or cholinesterase inhibiting drugs. Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

Harmful if swallowed. Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wear long-sleeved shirt and long pants, and shoes plus socks and chemical-resistant gloves (HOUSEHOLD OR LATEX RUBBER GLOVES) WHEN HANDLING THIS PRODUCT. REMOVE CLOTHING IMMEDIATELY if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, tobacco, or using the toilet. Remove contaminated clothing and wash before reuse.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is extremely toxic to aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

READ ALL DIRECTIONS PRIOR TO APPLICATION OF THE PRODUCT

DIRECTIONS FOR USE It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

RESTRICTIONS

- Not for use on turf being grown for sale or other commercial use as sod, or for commercial seed production, or for research purposes.
- Do not make more than 3 applications per year for ornamentals. The minimum retreatment interval is seven days.
- Watering in is required immediately after application to lawns.
- Do not apply more than 4 applications per year to lawns. The minimum retreatment period is seven days.
- For the kill of ticks, the maximum allowable application rate is 1.15 lb of product per 1000 sq. ft.
- In New York State, this product may not be applied to turf within 100 feet of a coastal marsh or of a water body, lake, pond, river, stream, wetland or drainage ditch. In New York State, do make a single repeat application of this product if there are signs of renewed insect activity, but not sooner than two weeks after the first application.
- Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. This product may be applied only by broadcast or drop type spreaders. Do not apply by hand, spoon or belly grinder. For outdoor use only.
- Apply this product directly to the lawn or garden area. Water treated area as directed on the label. Do not water to the point of run-off.
- Do not make applications during rain.

INFORMATION

This product kills listed pests on residential lawns, in and around flower beds, ornamental plantings and around the outside of homes.

HOW TO APPLY

- Apply uniformly over the treatment area with either a broadcast or drop type spreader. Apply only the specified amount in the following table. Calibrate the spreader before use and check periodically to ensure the equipment is working properly. Avoid overlaps that will increase rates above those specified. Do not over or under apply. Failure to follow the Directions for Use and all precautions may result in poor pest kill.
 - Product must be watered in immediately after application to lawns.
 - **BROADCAST SPREADERS:** Apply in a circular path starting on the outside and working toward the center.
 - **DROP SPREADERS:** First, apply 2 border strips along the edge of each end of the lawn. Then apply product along the length of the lawn, and shutting off the spreader before turning as you reach the edge of the border strips.
- Important:** It is important to follow the directions as indicated on this quality lawn care product. Measure the size of the area to be treated and do not over or under apply. Spreader settings are approximate. Differences may occur due to condition of spreader, speed at which applied, and roughness of area treated. Calibrate spreader prior to use according to the manufacturer's directions. Check frequently to be sure equipment is working properly and distributing uniformly. Close spreader when filling, stopping or turning. Do not over or under apply. Fill spreader over a hard surface. Promptly clean-up any spills.
- Recent research has shown that well-maintained turf is an effective environmental buffer that prevents pollutants from entering our natural water bodies. To help protect these natural resources, do not apply product to sidewalks, driveways, roadways, and other impervious surfaces which are adjacent to storm drains. Sweep any misplaced product back onto the area you are treating immediately after application, since storm drains often empty directly to nearby waterways.

WHEN TO APPLY

Due to pest activity differences, consult your local cooperative extension service for guidance on timing of application. To find your local extension agent, visit www.csees.usda.gov

SURFACE PESTS

Treat when pests or damage first appear.

SUBSURFACE PESTS

To effectively kill subsurface pests, apply when the insects are actively feeding near the soil surface. Contact local agricultural agents for timing of application in your area.

HOW MUCH TO APPLY

Pests	Pounds of Product per 1,000 sq ft.
Ants (except harvester, pharaoh and carpenter ants), Armyworms, Centipedes, Chiggers, Chinch Bugs, Cutworms, Earwigs, Essex Skipper, European Chafer, Fall Armyworm, Fiery Skipper, Grasshoppers, Green June Beetle Larvae, Leafhoppers, Lucerne Moth, Millipedes, Mosquitoes (young adults), Scarab Beetle Adults: such as May Beetle, June Beetle, Japanese Beetle, Green June Beetle, Sod Webworm (lawn moths), Sowbugs, Spittlebugs, Springtails, Yellowstriped Armyworms	2.25
Billbug Larvae, European Crane Fly Larvae, Fleas, White Grubs: Such as Japanese Beetle Larvae, Chafer Beetle Larvae, Phyllophaga spp. Larvae, Annual White Grubs, Black Turfgrass Ateaninus Beetle Larvae, Hyperdoes Weevil (Bluegrass Weevil Larvae)	2.4
Scorpions	1.7
Fleas	1.7 - 2.4
Ticks	1.15

Comments: Product must be watered in immediately following application. For heavy infestations of Chinch bugs, increase rate to 5 lbs. per 1,000 sq. ft. and treat the entire area. To effectively kill subsurface pests, apply when insects are actively feeding near the soil surface, usually during late March through May, or July through early September, or as guided by local agricultural extension service agents.

Will only kill pests present at the time of application. Pest must be directly contacted in order to be effective.

PEST KILL IN AND AROUND FLOWER BEDS AND ORNAMENTAL PLANTINGS AND AROUND OUTSIDE OF HOMES

Kills Ants (except harvester, pharaoh and carpenter ants), Armyworms, Centipedes, Crickets, Cutworms, Earwigs, Firebrats, Silverfish, Fleas, Millipedes, Sowbugs: Apply granules uniformly in a 6 foot band around the building at the rate of 2-4 lbs. per 1,000 square feet to shrub and flower beds, foundations, ornamental plantings and lawn or soil areas immediately adjacent to the building. Treated area must be watered in immediately after application. Repeat treatments as needed up to 3 times per year, but no more than once every seven days. Will only kill pests present at the time of application. Contact as many pests as possible.

STORAGE AND DISPOSAL Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

PESTICIDE STORAGE: Keep out of reach of children and animals. Store in original container only. Store in cool, dry place and avoid excess heat.

CONTAINER HANDLING: If Empty: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available.

PESTICIDE DISPOSAL: If Partly Filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

SPREADER SETTINGS: If your spreader is not listed, please call our Consumer Service Hotline toll free 1-877-229-3724 for help. **Rate: 2.4 lbs. per 1,000 sq. ft. Rate: 1.15 lbs. per 1,000 sq. ft.**

GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR: Si su esparcidor no se encuentra en la lista, solicite ayuda llamando a nuestro número gratuito de servicio al consumidor: 1-877-229-3724. **Tasa: 2.4 libras cada 1,000 pies cuadrados (93 m²). Tasa: 1.15 libras cada 1,000 pies cuadrados (93 m²).**

SPREADER SETTINGS/GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR		
Broadcast Spreaders Model Modelo de esparcidores al voleo	2.4 lb. Rate Setting** Graduación de tasa de 2.4 libras (1.09 kg)**	1.15 lb. Rate Setting** Graduación de tasa de 1.15 libras (.52 kg)**
SCOTTS (All Models)	3 1/2	2 1/2
VIGORO 10000	2	1 1/2
VIGORO 15000	2	1 1/2
Drop Spreaders Model Modelo de esparcidores por goteo	2.4 lb. Rate Setting** Graduación de tasa de 2.4 libras (1.09 kg)**	1.15 lb. Rate Setting** Graduación de tasa de 1.15 libras (.52 kg)**
SCOTTS (All Models)	4 3/4	4 1/2

**Settings are approximate. The condition of your spreader, the speed at which you walk and uneven terrain may affect the rate of application. Calibrate your spreader according to manufacturer's directions.

TIP: 1,000 sq. ft. = 20 ft. x 50 ft.

Do not use a spreader that applies granules in narrow, concentrated or uneven bands. Be sure the spreader works properly and spreads granules evenly.

**Las graduaciones son aproximadas. El estado del esparcidor, la velocidad a la que se camina, y la irregularidad del terreno pueden afectar la tasa de aplicación. Debe calibrarse el esparcidor de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

CONSEJO: 1.000 pies cuadrados = 20 pies x 50 pies (93 m² = 6,1 m x 15,2 m)

No usar un esparcidor que aplique los gránulos en franjas demasiado angostas, concentradas o irregulares. Asegúrese de que el esparcidor funcione correctamente y esparza los gránulos en forma pareja.

IMPORTANT: READ BEFORE USE: Read the entire Directions for Use and the Warranty Disclaimer and Limitation of Liability before using this product. If terms are not acceptable, return the unopened product container at once. By using this product, user or Buyer accepts the following Warranty Disclaimer and Limitation of Liability.

WARRANTY DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY: Manufacturer warrants that this product conforms to the chemical description on the label and is reasonably fit for the purposes stated on the label when used in strict accordance with the directions. Manufacturer makes NO OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. To the extent consistent with applicable law, it is Manufacturer's intent to LIMIT ANY LIABILITY FOR SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL ECONOMIC DAMAGES to refund of purchase price or replacement of product, at Buyer's choice. To the extent consistent with applicable law, Manufacturer DISCLAIMS ANY LIABILITY FOR COMPENSATORY OR OTHER DAMAGES ARISING OUT OF ANY USE CONTRARY TO LABEL DIRECTIONS. Use contrary to label directions is not permitted. LEGAL RIGHTS: THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS; YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE/JURISDICTION TO STATE/JURISDICTION.

NOTICE: This product contains a chemical known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm.

**except pharaoh, harvester, or carpenter ants

Distributed by: SBM Life Science Corp, 1001 Winstead Drive, Suite 500, Cary, NC 27513 BioAdvanced is a trademark of SBM Life Science Corp.

DATOS RÁPIDOS

- **Mata hormigas^{**}, pulgas, garrapatas, gusanos cortadores, chinches, grillos topo y otras plagas de la lista**
- **Mata las plagas que se alimentan del follaje y de la superficie de la lista** • **Mata los insectos sobre y debajo del suelo**
- **Mata los insectos de la superficie de la lista en 24 horas** • **Mata los insectos del suelo de la lista durante hasta 3 meses**
- **Uso en césped, plantas decorativas y alrededor del exterior de las casas**

Si tiene preguntas o comentarios, llame gratis al 1-877-229-3724 o visite nuestro sitio web en BioAdvanced.com

PRIMEROS AUXILIOS + Carbaryl es un insecticida carbamato de N-metil.

SI LO TRAGA Llamar al centro de control de envenenamiento o al médico para asesoramiento sobre el tratamiento. Hacer que la persona sorba un vaso de agua si puede tragar. No inducir el vómito a menos que lo indique un médico o el centro de control de envenenamiento. No dé nada a una persona inconsciente. **SI CAE EN LA PIEL O ROPA** Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel inmediatamente con mucha agua durante 15-20 minutos. Llamar al centro de control de envenenamiento o al médico para asesoramiento sobre el tratamiento. **SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS** Mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente y cuidadosamente con agua durante 15 o 20 minutos. Quitar los lentes de contacto, si los tuviera, luego de los primeros 5 minutos, continuar lavando. Llamar al centro de control de envenenamiento o al médico para asesoramiento sobre el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o cuando vaya para recibir tratamiento. **Puede comunicarse también al 1-800-757-8951 si necesita información sobre tratamiento médico de emergencia.** **DECLARACIÓN DE ANTIDOTO:** EL SULFATO DE ATROPINA ES UN ANTIDOTO ALTAMENTE EFECTIVO. Consulte la NOTA PARA EL MÉDICO. **Nota para el médico:** Carbaryl es un carbamato de N-metil que inhibe la colinesterasa. La atropina es alexifármaco. No usar 2-PAM (pyridine-2-aldoxime methiodide), opiáceos o medicamentos inhibidores de la colinesterasa. Probable daño mucosal puede contraindicar el uso de lavado gástrico.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Riesgos para seres humanos o animales domésticos

Riesgos si lo traga. Peligroso si se absorbe a través de la piel. Causa irritación moderada en los ojos. Evitar contacto con los ojos, piel o ropa. Usar camisa manga larga y pantalones largos, calcetines, zapatos y guantes resistentes a químicos (GUANTES DE CAUCHO O DOMÉSTICOS) CUANDO MANIPULE ESTE PRODUCTO. QUITAR LA ROPA INMEDIATAMENTE si el pesticida ingresa. Luego lavar cuidadosamente y ponerse ropa limpia. Lavar las manos antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o ir al baño. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto es extremadamente tóxico para los invertebrados acuáticos. Para proteger al medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o corra por los drenajes de tormenta, drenaje de aguas pluviales, canales o aguas superficiales. Aplicar este producto en clima calmado cuando no haya pronóstico de lluvia en las próximas 24 horas para asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Barrer todo producto que quede en caminos, aceras o calle, de nuevo hacia el área tratada del césped o jardín ayudará a evitar que el producto ingrese en cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

LEER TODAS LAS INDICACIONES DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO

INDICACIONES DE USO Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

RESTRICCIONES

- No usar en césped que se usa para la venta u otro uso comercial como pasto, o para producción comercial de semillas o con fines investigativos.
- No realizar más de tres aplicaciones por año para plantas decorativas. El intervalo de tratamiento mínimo es de siete días.
- Se debe regar inmediatamente luego de la aplicación al césped.
- No realizar más de 4 aplicaciones por año al césped. El periodo de tratamiento mínimo es de siete días.
- Para matar garrapatas, la tasa de aplicación permitida mínima es de 1.15 libras de producto cada 1000 pies cuadrados.
- En el estado de New York, este producto puede aplicarse al pasto dentro de los 100 pies de la marisma costera o de un cuerpo de agua, lago, laguna, río, arroyo, humedad o zanja de desagüe. En el estado de New York, realice una sola aplicación de este producto si hay señales de actividad renovada de insectos, pero no antes de dos semanas luego de su primera aplicación.
- No aplicar este producto de modo que entre en contacto con personas o mascotas ya sea directamente o por goteo. Mantener a las personas y mascotas fuera del área durante su aplicación. Este producto puede aplicarse solamente con rociadores de tipo goteo o de difusión. No aplicar a mano, con cuchara o con pulverizador de cintura. Para uso en exteriores solamente.
- Aplicar este producto directamente en el área del jardín o césped. Regar el área tratada tal como se indica en esta etiqueta. No regar hasta el punto que corra el agua.
- No realizar aplicaciones si llueve.

INFORMACIÓN

Este producto mata las plagas de la lista en céspedes residenciales, dentro y alrededor de canteros, plantas decorativas y alrededor de la parte externa de la casa.

CÓMO APLICARLO

- Aplicar de manera uniforme en el área de tratamiento con un rociador tipo goteo o de difusión. Aplicar solamente la cantidad especificada en la siguiente tabla. Calibrar el rociador antes de usarlo y controlarlo periódicamente para asegurar que el equipo funcione correctamente. Evitar superposición que aumentará la tasa antes especificada. No aplicar ni de más ni de menos. No cumplir con las indicaciones de uso y con todas las precauciones puede resultar en un mal tratamiento de la plaga.
 - El producto debe ser regado inmediatamente luego de su aplicación al césped.
 - **ROCIADORES DE DIFUSIÓN:** Aplicar en un trayecto circular comenzando desde la parte externa y trabajando hacia el centro.
 - **ROCIADORES POR GOTEIO:** Primero, aplicar 2 bandas en el límite a lo largo del borde de cada extremo del lugar. Luego aplicar el producto en la longitud del césped, y cierre el rociador antes de regresar cuando llegue al borde de las bandas de límite.
- Importante:** Es importante seguir las indicaciones tal como se indican en este producto de calidad de cuidado del césped. Mida el tamaño del área a tratar y no aplique de más o de menos. Las configuraciones del rociador son aproximadas. Las diferencias pueden ocurrir debido a la condición del rociador, la velocidad de aplicación y la rugosidad del área a tratar. Calibrar el rociador antes de usarlo de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Controlar con frecuencia para asegurarse que el equipo esté funcionando correctamente y la distribución sea uniforme. Cerrar el rociador cuando esté llenándolo, cuando se detenga o regrese. No aplicar ni de más ni de menos. Llenar el rociador sobre una superficie dura. Limpiar todo derrame oportunamente. Las investigaciones recientes han mostrado que el pasto bien mantenido en una efectiva protección ambiental que previene que los contaminantes ingresen en nuestros cuerpos naturales de agua. Para ayudar a proteger los recursos naturales, no aplicar el producto en aceras, caminos, rutas y otras superficies impenetrables que están junto a drenajes de tormenta. Barrer todo producto mal colocado sobre el área que esté tratando de manera inmediata luego de su aplicación, ya que los drenajes de tormenta a menudo desembocan directamente en las vías acuáticas cercanas.

CUÁNDO APLICARLO

Debido a las diferencias en la actividad en las plagas, consulte al servicio de extensión cooperativa local sobre el tiempo de su aplicación. Para encontrar su agente de extensión local, visite www.csees.usda.gov

PLAGAS DE SUPERFICIE

Tratar cuando la plaga o el daño aparecen por primera vez.

PLAGAS DE SUBSUPERFICIE

Para efectivamente matar las plagas de la subsuperficie, aplicar cuando los insectos estén alimentándose activamente cerca de la superficie del suelo. Comuníquese con los agentes locales agrícolas para conocer el tiempo de aplicación en su área.

CUÁNTO APLICAR

Plaga	Libras de producto por 1,000 pies cuadrados
Hormigas (excepto la cosechadora, faraona y carpintera), gusanos militares, ciempiés, niguas, chinches, gusanos cortadores, tijerillas, mariposa capitán de navío Essex, escarabajos de junio europeo, gusanos militares del otoño, saltarina amarilla, saltamontes, larvas del escarabajo de junio verde, saltamontes verde, polillas, diplopodas, mosquitos (jóvenes adultos), escarabajos adultos: tal como el escarabajo de mayo, el escarabajo de junio, el escarabajo japonés, el escarabajo verde de junio, los gusanos tejedores (polillas del césped), cochinitas de la humedad, cigarras espumadoras, colémbolos, gusanos militares de rayas amarillas	2.25
Larvas de escarabajos, larvas europeas de zanquiabro, pulgas y gusanos blancos: Tal como larvas del escarabajo japonés, larvas de escarabajo, larvas de Phyllophaga, gusanos blancos anuales, escarabajos negros del césped, gorgojos hiperóidos (larvas del picudo de las gramíneas anuales)	2.4
Escarabajos	1.7
Pulgas	1.7 - 2.4
Garrapatas	1.15

Comentarios: regado inmediatamente luego de su aplicación. En caso de infestaciones fuertes de chinches, aumentar la tasa a 5 libras por cada 1,000 pies cuadrados y tratar el área completa. Para matar efectivamente las plagas de subsuperficie, aplicar cuando los insectos se están alimentando activamente cerca de la superficie del suelo, generalmente a finales de marzo hasta mayo o desde julio hasta comienzos de setiembre, o según indiquen los agentes del servicio de extensión agrícola local. **Solo matará plagas presentes al momento de la aplicación. Las plagas deben estar en contacto directo con el producto para que sea efectiva.**


MATA PLAGAS EN Y ALREDEDOR DE LOS CANTEROS Y PLANTAS DECORATIVAS Y ALREDEDOR DE LA PARTE EXTERNA DE LA CASA

Mata hormigas (excepto las cosechadoras, faraonas y carpinteras), gusanos militares, ciempiés, grillos, gusanos cortadores, tijerillas, insectos de fuego, lepisma, pulgas, diplopodas, cochinitas de la humedad: Aplicar los gránulos de manera uniforme en una banda de 6 pies alrededor del edificio a una tasa de 2-4 libras por cada 1,000 pies cuadrados para canteros y arbustos, cimientos, plantas decorativas y áreas de suelo o césped inmediatamente adyacente al edificio. El área tratada debe ser regada inmediatamente luego de su aplicación. Repetir los tratamientos según sea necesario hasta 3 veces por año, pero no más de una vez cada siete días. Solo matará plagas presentes al momento de la aplicación. Poner en contacto con tantas plagas como sea posible.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contaminar alimentos, agua o alimentaciones por almacenamiento o eliminación.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Mantener fuera del alcance de los niños y animales. Almacenar en el contenedor original solamente. Almacenar en un lugar seco y fresco y evitar exceso de calor. **MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR:** Si está vacío: Contenedor no rellenable. No rellenar o volver a usar este contenedor. Ofrecer para su reciclado, si estuviese disponible. **CÓMO DESECHAR EL PESTICIDA:** Si está parcialmente lleno: Llamar a la agencia de eliminación de desechos sólidos para conocer las indicaciones de eliminación. Nunca colocar el producto sin usar en un drenaje de salida o de entrada.



40237730b 170323V1a