

Bioadvanced

Science Based Solutions

5 en 1

WEED AND FEED

- 1- MATA LAS MALEZAS RESISTENTES
- 2- PREVIENE QUE APAREZCAN NUEVAS MALEZAS
- 3- MATA EL ZÁCATE CANGREJO
- 4- PREVIENE QUE VUELVA A APARECER EL ZÁCATE CANGREJO
- 5- DA UN COLOR VERDE INTENSO DURANTE HASTA 3 MESES

PREVIENE LA APARICIÓN DE MALEZAS Y DEL ZÁCATE CANGREJO DURANTE HASTA 6 MESES

RINDE HASTA 4,000 PIES CUADRADOS

Úselo solamente en céspedes establecidos de los tipos mencionados abajo:

Césped Bermuda**, césped búfalo, césped azul de Kentucky, raigrás, cañuela, césped paspalum de la costa y césped zoysia.

**La aplicación en césped Bermuda puede causar un color amarillo o decoloración temporal pero puede esperar una recuperación completa.

22-0-4

PESO NETO 9.6 libras (4.35 kg.)

PARA USO RESIDENCIAL SOLAMENTE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Consultar el panel trasero para declaraciones adicionales de precaución

No es para venta, distribución o uso en el estado de New York.

INGREDIENTES ACTIVOS:

2,4-D (Ácido diclorofenoxiacético 2,4) 0.818%

Quinlo (Ácido 3,7-dicloro-8-quinolinecarboxílico) 0.419%

Dicamba (ácido 3,6-dicloro-o-anísico) 0.073%

Dithiopyr (S,S dimetil 2-(difluorometil)-4-(2-methylpropil)-6-(trifluorometil)piridina-3,5-Dicarbonate) 0.240%

OTROS INGREDIENTES 98.450%

TOTAL

¡EL MODO FÁCIL DE TENER EL MEJOR CÉSPED!

Mata más de 200 tipos de malezas*.

Se encarga de las malezas difíciles de matar, como el trébol, los dientes de león y el zácate cangrejo.

Crea una barrera de control extendido durante 6 meses que previene el crecimiento de malezas nuevas*.

Nutre, fortalece y da color a su césped.

INDICACIONES DE USO

Constituye una violación a la ley federal usar este producto de manera diferente a lo establecido en esta etiqueta

PARA LOGRAR MEJORES

- Aplicar sobre el césped húmedo con rocío.
- Aplicar cuando las malezas de hojas anchas son jóvenes y en crecimiento activo.
- Si necesita cortar el césped, hágalo 1 o 2 días antes (para mejores resultados) o 2 días después de aplicar este producto.
- Los recortes de los tres primeros cortes deben dejarse en las áreas tratadas. No usar los restos de cortes de las áreas tratadas como mantillo o compost alrededor de flores, plantas decorativas, árboles o en jardines de vegetales.
- Si el césped está seco, riegue 1 a 2 días antes de usar este producto.
- No riegue durante como mínimo 24 horas luego de la aplicación o aplique si se espera lluvia dentro de las 24 horas.

MALEZAS CONTROLADAS

Malezas tipo herbáceas: Control antes de la aparición de zacate cangrejo, cola de zorro y otras malezas del pasto*. Control luego de la aparición del zacate cangrejo.

Malezas de hoja ancha: Control antes de la aparición de las malezas de hoja ancha*. Control después de la aparición de más de 200 malezas de hoja ancha*.

DÓNDE USAR

Úselo solamente en céspedes establecidos de los tipos mencionados abajo: Césped Bermuda**, césped búfalo, césped azul de Kentucky, raigrás, cañuela, césped paspalum de la costa y césped zoysia.

No usar sobre el césped Césped Bermuda, axonopus, gramíneas anuales (Poa annua), agrostis, césped ciempiés, césped de San Agustín (incluyendo Floratam) o Dichondra.

**La aplicación en césped Bermuda puede causar un color amarillo o decoloración temporal pero puede esperar una recuperación completa.

CÓMO FUNCIONA:

Este producto contiene cuatro exterminadores probados de malezas para controlar las malezas que aparecen en la lista* y el zacate cangrejo, raíces y todo. Además, previene la aparición del zacate cangrejo y de malezas de hoja ancha durante seis meses, ya que forma una barrera en la capa superior del suelo. Y no dañará su césped si lo usa como se indica. Las malezas* comienzan a morir en horas y quedan completamente muertas dentro de los 14-28 días. Además, combinado con los fertilizantes, nutre y da color a su césped y ofrece una nutrición de larga duración.

El zacate cangrejo tratado comienza a ponerse púrpura a los 3 días, esa es la señal de que está funcionando.

DÓNDE APLICAR

Este producto puede aplicarse como una sola aplicación o como aplicaciones divididas en la primavera y a comienzos del verano o del otoño, con aplicaciones no antes de los 30 días de la primera aplicación.

- Aplicar en primavera luego de que el césped esté en crecimiento activo y haya sido cortado dos veces.
- Aplicar en otoño no antes de 2-6 semanas de la fecha de la primera helada histórica en su área.
 - Para las malezas del pasto tales como el zacate cangrejo aplicar en primavera o a comienzos del verano.
 - Para lograr mejores resultados, aplicar dos semanas antes de la germinación de la semilla de la maleza o cuando las semillas son pequeñas y están en crecimiento activo (cuando el zacate cangrejo está apareciendo y es visible en algunas zonas del césped).
 - Para controlar la maleza de hoja ancha, aplicar en primavera y otoño.
- Aplicar cuando el aire está calmo para evitar que se esparza en plantas no deseadas.
 - Aplicar cuando las temperaturas están entre los 50-90° F, y no por encima de los 85°F. en el pasto Bermuda.
 - Puede sembrarse el terreno 12 semanas luego de usar este producto.

Cómo usarlo

- Usar rociadores del tipo goteo o rotativo para aplicar gránulos de manera pareja sobre el césped. Para asegurarse de cubrir el área de manera uniforme, primero tratar el borde del césped y luego completar en el centro. Hacer pases paralelos, caminando a un ritmo constante para asegurar la distribución pareja de los gránulos.
- Si usa un rociador rotativo o por aspersión, asegúrese de que cada franja pase por encima de la franja anterior para asegurar una cobertura completa. (Consultar Fig A.)
- Si usa un rociador por goteo, asegúrese de que las ruedas no pasen por encima de las marcas de las ruedas en el pasto de la franja anterior para asegurarse de realizar una cobertura completa. (Consultar Fig. B)
- Barra, cepille o sople todo material aplicado accidentalmente fuera del camino, acera, etc. nuevamente hacia el césped.
- Luego de la aplicación, las malezas tratadas pueden ponerse con un leve color púrpura; esto es indicación de que el herbicida está trabajando

CONFIGURACIÓN DEL

Si su rociador no aparece en la lista, llame a nuestra línea gratuita de servicio al consumidor al (877) 229-3724 para recibir ayuda.

Las configuraciones son aproximadas. La condición de su rociador, la velocidad a la que camina y el terreno desparejo pueden afectar el volumen de aplicación. Calibre su rociador de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- Consejo: 1,000 p. cuadrados = 20 pies x 50 pies
- No use un rociador que aplique gránulos en bandas desparejas, concentradas o angostas. Asegúrese de que el rociador funcione correctamente y disperse los gránulos de manera pareja.

Rociadores de difusión

por

Rociador por goteo

Fig. A – Asegúrese de que cada franja pase por encima de la franja anterior para asegurar una cobertura completa.

Fig. B – Asegúrese de que las ruedas no pasen por encima de las marcas de las ruedas en el pasto de la franja anterior para asegurarse de realizar una cobertura completa.

Rociador por difusión	CONFIGURACIÓN
Scotts EdgeGuard	2 ¾
Scotts Mini 2000	2
Sta-Green	3 ¼
Vigoro	5

Rociador por goteo	CONFIGURACIÓN
Scotts Drop Spreader	2 ¾

RESTRICCIONES DE USO

- No aplicar este producto de modo que entre en contacto con personas o mascotas ya sea directamente o por goteo. Mantener a las personas y mascotas fuera del área durante su aplicación. No permitir que las personas o mascotas ingresen en el área con tratamiento hasta que el polvo se haya asentado.
- Usar este producto solo en céspedes establecidos que aparecen en la lista en esta etiqueta – céspedes nuevos pueden ser tratados luego de que lo haya podado cuatro veces. No realizar aplicaciones secuenciales con menos de 30 días.
- Solo aplicar en césped de crecimiento activo
- No aplicar mientras la hierba del césped se está poniendo verde o casi en primavera.
- No aplicar este producto si el césped parece no estar saludable, por ejemplo, por falta de agua, enfermedades, calor excesivo, lesiones químicas, etc.
- No permitir que los gránulos entren en contacto con las flores, los arbustos o árboles ornamentales u otras plantas preferidas de hoja ancha, ya que puede ocurrir una lesión grave en la planta.
- No realizar más de dos aplicaciones por lugar en un periodo de 12 meses.
- No aplicar más de 2.4 libras de este producto por cada 1,000 pies cuadrados por aplicación.
- No liberar rocío a una altura mayor a 30 pulgadas por encima del suelo.

En caso de siembra, plantación por gajos o sobresiembra

- La siembra, plantación por gajos o sobresiembra de un terreno tratado con este producto debe demorarse hasta 12 semanas desde la fecha de la aplicación.
- La siembra, plantación por gajos o sobresiembra antes de las 12 semanas de aplicación puede impedir que la hierba del césped se establezca.
- Cuando se sobresiembra o se siembra, se deben seguir prácticas culturales adecuadas tal como cultivo del suelo, irrigación y fertilización.
- Si se sobresiembra con raigrás perenne en el otoño, deberá sobresiembra 8 semanas o más después de una sola aplicación.

**De la lista

