

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

FUNGUS CONTROL FOR LAWNS

READY-TO-SPREAD GRANULES II



CURES & PREVENTS
COMMON LAWN DISEASES

PROTECTS
UP TO
1 MONTH




FUNGUS CONTROL FOR LAWNS

READY-TO-SPREAD GRANULES II



CURES & PREVENTS
COMMON LAWN DISEASES

CONTROLS **BROWN PATCH, DOLLAR SPOT,**
RUSTS, SUMMER PATCH, ANTHRACNOSE
& OTHER LISTED DISEASES



BROWN PATCH

DOLLAR SPOT

TREATS UP TO
5,000 SQ. FT.
NET WEIGHT 10 lb. (4.5 kg.)

STOP - READ THIS ENTIRE LABEL BEFORE USE
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional
precautionary statements
FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE ONLY

ACTIVE INGREDIENT:	
Propiconazole†	0.51%
OTHER INGREDIENTS	99.49%
TOTAL	100.00%
†CAS# 60207-90-1	



FUNGUS CONTROL FOR LAWNS

READY-TO-SPREAD GRANULES II

CURES & PREVENTS
COMMON LAWN DISEASES

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

FUNGUS CONTROL FOR LAWNS

READY-TO-SPREAD GRANULES II



CURES & PREVENTS
COMMON LAWN DISEASES



FUNGUS CONTROL FOR LAWNS

READY-TO-SPREAD GRANULES II

This product cures and prevents turf damaging diseases, and keeps them from invading your lawn. This rainproof formula provides up to 1-month protection against most common lawn diseases including Brown Patch, Dollar Spot, Summer Patch, Rusts and Anthracnose. Keeping your lawn free of listed diseases has never been easier.

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- Cures and Prevents Common Lawn Diseases
- Systemic Fungicide is Absorbed by Grass and Will Not Wash Off
- Easy-to-Use Granules

CONTROLS	Anthracnose, Brown Patch, Dollar Spot, Fusarium Patch, Powdery Mildew, Red Thread, Rusts, Stripe Smut, Summer Patch, and Snow Mold
WHERE TO USE	On lawns
WHEN TO USE	• To treat an existing disease: Apply at first sign of disease • To prevent diseases: Make first application before conditions are favorable for disease.
COVERAGE	• Up to 5,000 square feet (See spreader settings)
 	For questions or comments, call toll-free 1-877-229-3724, or visit our website at www.BioAdvanced.com

ACTIVE INGREDIENT: Propiconazole 0.51 %
OTHER INGREDIENTS: 99.49 %
TOTAL 100.00 %

EPA Reg. No. 92564-38
EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(77) = 070989-MQ-001 (89) = 9198-AL-01 (79) = 5905-GA-01 (57) = 071006-GA-003 (46) = 88746-MQ-1

FOR OUTDOOR
RESIDENTIAL USE ONLY

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For best results, read and follow all label directions.

BEFORE YOU USE	• If lawn is very dry, water and let dry before applying.	
USE PRECAUTIONS AND RESTRICTIONS	• Do not apply near fish pools, ponds, streams or lakes. • Do not allow adults, children, or pets to enter the treated area until the granules have been watered in and allowed to dry. • Do not apply this product in a way that will contact adults, children, or pets, either directly or through drift.	

HOW TO USE

HOW TO APPLY	• Apply product with rotary/drop spreader at rate given below. • Water lawn after application.	  
--------------	--	---

CONTROLS	HOW MUCH TO APPLY:	WHEN TO APPLY:
Dollar Spot, Anthracnose, Brown Patch, Powdery Mildew, Rusts, Red Thread, Gray Leaf Spot, Melting Out Leaf Spot	Curative Rate: 3.5 lbs/1000 sq. ft. (See Spreader Settings Table) Preventative Rate: 2 lbs/1000 sq. ft.	Curative: Apply at 14-day intervals until control is achieved, then reduce to preventative rate and timing. Preventative: Apply at 21-30 day intervals until cooler, drier weather arrives. Apply once in spring when grass begins to grow.
Stripe smut		Apply at 30 day intervals beginning in spring (mid-May) or 1 month before this disease usually appears in your area.
Summer Patch		Apply in fall or spring to reduce severity of disease.
Take All Patch	Preventative Rate: 3.5 lbs/1000 sq. ft.	Apply when conditions are favorable for disease development.
Fusarium Patch		Apply in late fall before snow cover. Do not apply on top of snow.
Pink or Gray Snowmold		

Do not exceed more than 5 applications per year

FOR BEST RESULTS	Best results are obtained when this product is used as a disease preventative in a complete lawn care program. Most lawn diseases thrive in hot, humid temperatures and under or over fertilized lawns. Thatch build-up also contributes to the problem. Water your lawn in the early morning, never in the late evening. It is best to have a soil test conducted to determine nutrient deficiencies before fertilizing. De-thatch whenever more than 1/2-inch of thatch exists. Mow often at a height recommended for your grass type and the season. For more information on what you can do to control lawn diseases, contact your local County Extension Service (usually found in the white pages of the phone book under the name of your county).	
HOW THIS PRODUCT WORKS	Watering after application carries the fungicide into the root zone. It enters the grass through its roots and blades. Rain or water cannot wash off this internal protection!	

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.	
PESTICIDE STORAGE	Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.
PESTICIDE DISPOSAL 	Nonrefillable Container. Do not reuse or refill this container. If Empty: • Place empty bag in trash or offer for recycling if available If Partly Filled: • If it is necessary to dispose of unused product, please call your local solid waste agency or you may call toll-free 1-877-229-3724 for disposal instructions. • Never place unused product down any indoor or outdoor drain.
Important: Use all of the product in accordance with label directions. If it is necessary to dispose of unused product, please follow any applicable state or local guidelines.	

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION	HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS
Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.	

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This pesticide is toxic to fish and shrimp. Do not apply directly to water. Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment washwaters or rinsate. Drift and runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters, or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.
- If rinsing spreader with water, return rinse water into treated areas.

FIRST AID:

IF IN EYES	• Hold eyes open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF ON SKIN OR CLOTHING	• Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF SWALLOWED	• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told by a poison control center or doctor.
IF INHALED	• Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

NOTE: When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor's office, bring this product label to show medical personnel. You may call toll-free 1-877-229-3763 for medical emergency information. Active ingredient: Propiconazole 0.51% (CAS # 60207-90-1).

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. To the extent consistent with applicable law, the Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions on this label.

SPREADER SETTINGS: If your spreader is not listed, please call our toll-free Consumer Service Hotline 1-877-229-3724 for help.

GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR: Si su esparcidor no figura en la lista, llamar a la línea gratuita del Servicio al Consumidor en el 1-877-229-3724 para obtener ayuda.

SPREADER SETTINGS/GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR			
Broadcast Spreaders Model Modelo de esparcidores al voleo	2 lb.Rate Setting Graduación de tasa de 2 libras (0.9 kg)	3.5 lb.Rate Setting Graduación de tasa de 3.5 libras (1.5 kg)	Distance Between Passes (ft.) Distancia entre las pasadas (pies)
SCOTTS BASIC		5	5
SCOTTS STANDARD		5.25	5
SCOTTS DELUXE EDGE GUARD		6	6
VIGORO 10000		7	8
VIGORO 15000		5.5	8/9
Drop Spreaders Model Modelo de esparcidores por goteo	2 lb.Rate Setting Graduación de tasa de 2 libras (0.9 kg)	3.5 lb.Rate Setting Graduación de tasa de 3.5 libras (1.5 kg)	Distance Between Passes (ft.) Distancia entre las pasadas (pies)
SCOTTS ACCUGREEN 1000	8.5	9.5	N/A
SCOTTS ACCUGREEN 2000	7.25	9	N/A
SCOTTS ACCUGREEN 3000	7.25	9	N/A

Settings are approximate. The condition of your spreader, the speed at which you walk and uneven terrain may affect the rate of application. Calibrate your spreader according to manufacturer's directions.
Do not use a spreader that applies granules in narrow, concentrated or uneven bands. Be sure the spreader works properly and spreads granules evenly. Tip: 1000 sq. ft. = 20 x 50 ft
Las graduaciones son aproximadas. El estado de su esparcidor, la velocidad a la que usted camina y el terreno irregular pueden afectar la tasa de aplicación. Calibrar el esparcidor según las indicaciones del fabricante.
No utilizar un esparcidor que aplique los granúlos en bandas angostas, concentradas o irregulares. Asegurarse de que el esparcidor funciona correctamente y disemina los granúlos uniformemente. Dato: 1000 pies cuadrados (92m2) = 20 x 50 pies

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.

Distributed by: SBM Life Science Corp., PO Box 525, Morrisville, NC 27560

BioAdvanced is a trademark of SBM Life Science Corp.

Product of Switzerland

400216741 170509V1

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Cura y previene enfermedades frecuentes del césped
- La hierba absorbe el fungicida sistémico y no se lava
- Gránulos fáciles de utilizar

CONTROLA	Antracnosis, parche marrón, mancha de dólar, fusariosis, mildiu polvoriento, hilo rojo, roya, tizón rayado, mancha de verano, moho de la nieve.
DÓNDE USAR	En céspedes
CUÁNDO USAR	• Para tratar una enfermedad existente: Aplicar ante el primer signo de la enfermedad. • Para prevenir enfermedades: Realizar la primera aplicación antes de que las condiciones sean favorables para alguna enfermedad.
COBERTURA	• Hasta 5,000 pies cuadrados (460 metros cuadrados) (Ver las graduaciones del esparcidor)
 	Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-229-3724 o visite nuestro sitio web en www.BioAdvanced.com

INGREDIENTE ACTIVO Propiconazol 0.51 %
OTROS INGREDIENTES 99.49 %
TOTAL 100.00 %

SÓLO PARA USO
RESIDENCIAL EN
EXTERIORES

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta. Para obtener mejores resultados, leer y seguir todas las indicaciones de la etiqueta.	
ANTES DE USAR	• Si el césped está muy seco, regar y dejar secar antes de aplicar.
PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DE USO	• No aplicar cerca de estanques de peces, lagunas, arroyos o lagos. • No permita que adultos, niños ni mascotas entren al área tratada hasta que los granúlos se hayan disueltos o el área se haya secado. • No aplique este producto de forma tal que entre en contacto con adultos, niños o mascotas, ya sea en forma directa o por deriva.

CÓMO USAR

CÓMO APLICAR	• Aplicar el producto con un esparcidor giratorio o de goteo a la tasa que se indica a continuación. • Regar el césped después de la aplicación.	  
--------------	--	--

CONTROLA	CUÁNTO APLICAR	CUÁNDO APLICAR
Mancha de dólar, Antracnosis, Parche marrón, Mildiu polvoriento, Roya, Hilo rojo, Mancha gris de la hoja, Mal de pie de la mancha de la hoja	Tasa curativa: 3.5 libras/1000 pies cuadrados (1.5kg/92 m2) (Ver la Tabla de graduaciones del esparcidor) Tasa preventiva: 2 libras/1000 pies cuadrados (0.9kg/92 m2)	Curación: Aplicar en intervalos de 14 días hasta lograr el control, luego reducir a la tasa preventiva y el tiempo. Prevención: Aplicar en intervalos de 21 a 30 días hasta la llegada del clima más fresco y seco.
Tizón rayado		Aplicar una vez en primavera cuando el césped comienza a crecer.
Mancha de verano	Tasa preventiva: 3.5 libras/1000 pies cuadrados (1.5kg/92 m2)	Aplicar en intervalos de 30 días comenzando en primavera (mediados de mayo) o 1 mes antes de la época en que generalmente aparece esta enfermedad en su área.
Pudrición radical		Aplicar en otoño o primavera para reducir la gravedad de la enfermedad.
Fusariosis		Aplicar cuando las condiciones sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.
Moho rosa o gris de la nieve		Aplicar a fines del otoño antes de que el césped se cubra de nieve. No aplicar sobre la nieve.

No exceda más de 5 aplicaciones por año.

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS	Los mejores resultados se obtienen cuando este producto se utiliza como prevención de enfermedades en un programa completo para el cuidado del césped. La mayoría de las enfermedades del césped proliferan en temperaturas cálidas y húmedas y en céspedes con poca fertilización o fertilizados en exceso. La acumulación de paja también contribuye con este problema. Regar el césped a la mañana temprano, nunca a últimas horas de la tarde. Lo más conveniente es realizar una prueba de la tierra para determinar las deficiencias nutricionales antes de fertilizar. Quitar la paja cada vez que se acumule más de 1/2 pulgada (1,3 cm) de paja. Segar con frecuencia a la altura recomendada para el tipo de césped y la estación. Para obtener más información sobre lo que puede hacer para controlar las enfermedades del césped, comuníquese con el Servicio de Extensión del Condado local (generalmente se encuentra en las páginas blancas de la guía telefónica debajo del nombre de su condado).	
CÓMO FUNCIONA ESTE PRODUCTO	El riego después de la aplicación traslada el fungicida a la zona de la raíz. Ingresa al césped a través de sus raíces y briznas. La lluvia o el agua no pueden quitar esta protección interna.	

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

No contamine el agua, los alimentos o el forraje mediante el almacenamiento y la eliminación.	
ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA	Guarde el producto en el envase original en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario con llave. Protéjalo de la congelación.
ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA 	Envase no reusable: No vuelva a usar o llenar este envase. Si está vacío: • Coloque el envase vacío en la basura o entréguelo para reciclar de ser posible. Si está parcialmente lleno: • Si es necesario deshacerse del producto sobrante, llame a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para obtener indicaciones sobre la eliminación. • Nunca coloque el producto sobrante en ningún desagüe interno o externo.
Importante: Use todo el producto según las indicaciones de la etiqueta. Si es necesario deshacerse del producto sobrante, por favor siga las normas vigentes locales o estatales.	

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN	RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
Causa moderada irritación en los ojos. Evitar el contacto con los ojos y la ropa. Lavar bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de ingerir, beber, comer goma de mascar, fumar tabaco o ir al baño.	

RIESGOS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los peces y langostinos. No aplicar directamente al agua. No contaminar el agua cuando se limpia el equipo o desecha el agua del lavado o enjuague del equipo. La deriva y el escurrimiento pueden ser perjudiciales para los organismos acuáticos en aguas contiguas a las áreas tratadas. • Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjías, alcantarillas o aguas superficiales. La aplicación de este producto cuando el clima está calmo y no haya probabilidad de lluvia para las próximas 24 horas garantizará que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar cualquier producto sobre la entrada de autos, senderos laterales o calles adosadas al área tratada del patio o jardín ayudará a evitar el escurrimiento de masas de agua o sistemas de drenaje. • Si enjuaga el esparcidor con agua, deje que ese agua caiga sobre las áreas tratadas.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS	• Mantener los ojos abiertos y enjuagar lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Quitar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico para consultas sobre el tratamiento.
EN CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA	• Quitar la ropa contaminada. • Enjuagar la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico inmediatamente para consultas sobre el tratamiento.
EN CASO DE INGESTIÓN	• Llamar inmediatamente a un centro de control de envenenamiento o a un médico para consultassobre el tratamiento. • Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar. • No inducir el vómito a menos que lo indique el centro de control de envenenamiento o el médico.
EN CASO DE INHALACIÓN	• Trasladar a la persona a un lugar fresco. • Si la persona no respira, llamar al 911 o a una ambulancia, luego pract car respiración artificial, preferentemente boca a boca si es posible. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico para mayores consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Al llamar al centro de control de envenenamiento, tener a mano la etiqueta del producto. En caso de buscar ayuda en una sala de emergencias o en el consultorio médico, llevar la etiqueta del producto para mostrarla al personal médico. Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763. Ingrediente activo: Propiconazol 0,51% (CAS N° 60207-90-1).

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. De acuerdo con la ley pertinente, el Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones de esta etiqueta.