

Treats up to
10,000
Sq.Ft.

BIOADVANCED®
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

COMPLETE[®] INSECT KILLER

For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules

2-WAY FORMULA[†]

PROTECTS YOUR LAWN FROM TOP TO BOTTOM

Kills Surface Insects*

Kills Soil Insects*
for up to **3 Months**

*listed insects
† Contains both contact and systemic insecticide.

Active Ingredients:
Imidacloprid 0.15%
β-Cyfluthrin 0.05%
Other Ingredients... 99.80%
Total 100.00%

STOP - Read This Entire Label Before Use

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back panel for additional precautionary statements

Not for sale, sale into, distribution and or use in Nassau, Suffolk, Kings, and Queens counties of New York.



FÓRMULA DE 2 VÍAS
Mata insectos* de superficie
Mata insectos de suelo* hasta por 3 meses

Treats up to
10,000 Sq Ft
NET WT 10Lb (4.5kg)

BIOADVANCED®
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

**COMPLETE[®]
INSECT KILLER**
For Soil & Turf Ready-To-Spread Granules

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- Kills Over 30 Outdoor Listed Pests in Lawns & Around Home
- Long-Lasting - Up To 90-Day Subsurface Insect Protection

KILLS	Ants, Fleas, Ticks ^{††} (including deer ticks), White Grubs, Chinch Bugs, Mole Crickets, European crane fly larvae and other listed pests
COVERAGE	Covers up to 10,000 sq. ft. for ants, fleas, and ticks. Covers up to 5,000 sq. ft. for all other listed pests.
WHERE TO USE	Lawn, Ground Covers, Flower Beds, Around Trees & Shrubs, and Around Homes
WHEN TO USE	Surface Pests: Whenever insects are present White Grubs: May through July European crane fly larvae: Apply once, when adult insects are present in large numbers
HOW MUCH TO USE	See directions
	For questions or comments, call toll-free 1-877-229-3724 or visit our website at www.BioAdvanced.com

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Before use, read and follow all label directions.

BEFORE YOU USE **Restrictions:** • Do not apply near fish ponds, ponds, streams or lakes. • Do not use food utensils such as teaspoons and measuring cups for food purposes after use with this insecticide. • Keep people and pets away from treated area until it is dried and watered and allowed to dry. • Do not use in vegetable gardens. • Do not apply this product, by any application method, to Linden, basswood, or other Tilia species. • Do not apply more than 0.4 lbs of Imidacloprid per acre per year. This bag contains 0.015 lbs of Imidacloprid.

HOW TO USE

HOME PERIMETER TREATMENT - HOW TO USE

PESTS Ants, Centipedes, Cockroaches, Crickets, Digger Wasps, Earwigs, Fleas, Millipedes, Pillbugs, Scorpions, Sowbugs, Spiders, Termites^{††}, Ticks^{††} (including deer ticks)

HOW MUCH TO APPLY • 1/6 to 1/2 cup per 45 to 50 ft. (2 to 3 ft. band) • 1 to 3 lbs. per 1,000 sq. ft. - ants, fleas, & ticks • Apply 2-3 lbs per 1,000 sq. ft. - all other listed pests. • Covers up to 10,000 sq. ft. (a band 2 feet wide and 5,000 feet long). • If pest pressure is high, apply at the rate of 3 lbs per 1,000 sq. ft.

HOW TO APPLY **Around the Exterior Perimeter of the House** To keep these pests away from your home, apply granules in a band 2 to 3 feet wide around and up to the structure. Water in thoroughly after applying. To prevent pest damage, apply this product early - when pests are still young and easier to kill. **TIP:** A hand-held spreader makes this easy.

MOUND TREATMENT - HOW TO USE

PESTS Ants, Digger Wasps (Cicada killer)

HOW MUCH TO APPLY • 1 to 2 teaspoons per mound or wasp burrow.

HOW TO APPLY **For Ant Mounds or Wasp Burrows** Sprinkle 1 to 2 teaspoons of granules over the ant mound or wasp burrow. Treat wasps at night, after they are back in their nest. Water in thoroughly after applying.

TO CONTROL LISTED PESTS IN AND AROUND THE LAWN - HOW TO USE

PESTS Annual Bluegrass weevil (Hyperodes weevil), Ants, Armyworms, Billbugs, Black Turfgrass Aeneas, Chiggers, Chinch Bugs, Cutworms, European crane fly larvae, Fleas, Grasshoppers, Leafhoppers, Mealybugs, Mole Crickets, Mosquitoes, Sod Webworms (lawn moth), Tick^{††} (including deer ticks), White Grubs (including larvae of Asiatic Garden Beetle, Black Turfgrass Aeneas, Chafers, Japanese Beetle, May or June Beetle, and Oriental Beetle)

HOW MUCH TO APPLY • Apply 1 to 3 lbs per 1,000 sq ft - ants, fleas, and ticks. • Apply 2-3 lbs per 1,000 sq. ft. - all other listed pests. • Adjust your spreader to the proper setting. See the following table. • This bag covers 10,000 sq. ft. which is the same as a lawn 100 feet wide and 100 feet long. • If pest pressure is high, apply at the rate of 3 lbs per 1,000 sq. ft. • For control of European crane fly larvae apply 3 lbs per 1,000 sq. ft.

HOW TO APPLY Use rotary or drop type spreaders to apply granules evenly over the lawn, flower beds, ground covers, and around trees/shrubs. To be sure you cover lawn areas uniformly, first treat the border of the lawn then fill in the center. Make parallel passes, walking at a steady pace to ensure even distribution of the granules. Water thoroughly within 1 day after applying. To prevent pest damage, apply this product early - when pests are still young and easier to kill. **TIP:** For best control of white grubs, mole crickets, and European crane flies apply just before egg hatch. Contact your County Extension Agent for the ideal dates to apply in your area.

PESTS

HOW MUCH TO APPLY • 1/4 cup per mound

HOW TO APPLY **Fire Ant Mounds** Sprinkle evenly over mound. Treat new mounds as they appear. Water in thoroughly after applying.

APPLICATION RESTRICTIONS • Apply this product directly to the lawn or garden area. Water treated area as directed on this label. • Do not water to the point of run-off. • Do not make applications during rain. • Do not mow until the granules are thoroughly watered in. • Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably in a locked storage cabinet.

PESTICIDE DISPOSAL: If Empty: • Non-refillable container. Do not refill or reuse this container. • Place in trash or offer for recycling if available.

If Partially Filled: • Call your local solid waste agency or 1-877-229-3724 for disposal instructions. • Never place unused product down any outdoor or indoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

• Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through skin. • Causes moderate eye irritation. • Avoid contact with skin, eyes or clothing. • Wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum or using tobacco. • Remove contaminated clothing and wash clothing before reuse.

FIRST AID

IF SWALLOWED • Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF INHALED • Move person to fresh air. • If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

IF ON SKIN • Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

NOTE: When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor's office, bring this product label to show medical personnel.

You may call toll-free 1-877-229-3763 for medical emergency information.

Active Ingredient: 0.15% Imidacloprid (CAS # 138261-41-3) and 0.05% Beta-Cyfluthrin (CAS # 68359-37-5).

ENVIRONMENTAL HAZARDS

• This pesticide is toxic to fish. • To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not wash or back pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

• Apply this product only as specified on this label.

NOTE: Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. The Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

EPA Reg. No. 92564-13
EST. No. 12564-13 and 4th digits of the batch number on this package. (89) = 919B-AL-01 (46) = 8466-MO-1

SPREADER SETTINGS: If your spreader is not listed, please call our Consumer Service Hotline toll free 1-877-229-3724 for help. **Rate:** 1 to 3 lbs. per 1,000 sq. ft.

GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR: Si su esparcidor no se encuentra en la lista, solicite ayuda llamando a nuestro número gratuito de servicio al consumidor: 1-877-229-3724. **Tasa:** 1 a 3 libras (0.45 a 1.4 kg) cada 1,000 pies cuadrados (93 m²).

SPREADER SETTINGS/GRADUACIONES DEL ESPARCIDOR

Broadcast Spreaders Model Modelo de esparcidores al voleo	1 lb. Rate Setting ^{††} Graduación de tasa de 1 libra (0.45 kg) ^{††}	2 lb. Rate Setting ^{††} Graduación de tasa de 2 libras (0.9 kg) ^{††}	3 lb. Rate Setting ^{††} Graduación de tasa de 3 libras (1.4 kg) ^{††}	Distance Between Passes (ft.) Distancia entre las pasadas (pies)
SCOTTS BASIC	3	4.25	4.25	9
SCOTTS STANDARD	3	4	5.5	10
SCOTTS DELUXE EDGE GUARD	3	3.75	4.5	8
YIGOR 10000	5	6.5	7	12
YIGOR 15000	2	3	5	10

**Drop Spreaders Model
Modelo de esparcidores por gota**

Drop Spreaders Model Modelo de esparcidores por gota	1 lb. Rate Setting ^{††} Graduación de tasa de 1 libra (0.45 kg) ^{††}	2 lb. Rate Setting ^{††} Graduación de tasa de 2 libras (0.9 kg) ^{††}	3 lb. Rate Setting ^{††} Graduación de tasa de 3 libras (1.4 kg) ^{††}	Distance Between Passes (ft.) Distancia entre las pasadas (pies)
SCOTTS ACCUGREEN 1000	2	3.25	4.25	N/A
SCOTTS ACCUGREEN 2000	2	3.25	4	N/A
SCOTTS ACCUGREEN 3000	2	3.25	4.5	N/A

****Settings are approximate. The condition of your spreader, the speed at which you walk and uneven terrain may affect the rate of application. Calibrate your spreader according to manufacturer's directions.**

TIP: 1,000 sq. ft. = 20 ft. x 50 ft.

Do not use a spreader that applies granules in narrow, concentrated or uneven bands. Be sure the spreader works properly and spreads granules evenly.

††Las graduaciones son aproximadas. El estado del esparcidor, la velocidad a la que se camina, y la irregularidad del terreno pueden afectar la tasa de aplicación. Debe calibrarse el esparcidor de acuerdo con las indicaciones del fabricante.

CONSEJO: 1,000 pies cuadrados = 20 pies x 50 pies (93 m² = 6.1 m x 15.2 m)

No use un esparcidor que aplique los granúlos en franjas demasiado angostas, concentradas o irregulares. Asegúrese de que el esparcidor funcione correctamente y esparza los granúlos en forma pareja.

• Contiene insecticida de contacto y sistémico

• Este producto exterminará termitas, alheyes y reproductores alados que ingresen al área tratada. El uso de este tipo de producto para matar los termitas no debe considerarse un sustituto del tratamiento en el suelo contra las termitas subterráneas que realice un operador de control de plagas profesional.

• Este producto extermina garrapatas que están en las superficies tratadas. Puede ser necesario usar otro producto registrado para tratar diñoles y sapos donde también viven las garrapatas.

This product contains SBM Life Science Corp.'s proprietary 2-way action formula[†]. This product's 2-way action controls turf pests including ants, fleas, and ticks plus soil pests including grubs in one easy step. It not only kills existing listed soil pests, but also keeps on protecting for up to 90 days. Keeping the yard, lawn, and around your home free of listed nuisance pests has never been easier.

¡LEA LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Mata más de 30 plagas de exteriores de la lista en jardines y alrededor de la casa.
- Protección subterránea contra insectos duradera hasta 90 días.

MATA	Hormigas, pulgas, garrapatas ^{††} (incluyendo garrapatas de los ciervos), gusanos blancos, chinches de los cereales, grillos topos, larvas de la tipula paludosa y otras plagas que figuran en la lista.
COBERTURA	Cubre hasta 10,000 pies cuadrados (alrededor de 900 m ²) para hormigas, pulgas y garrapatas. Cubre hasta 5,000 pies cuadrados (alrededor de 450 m ²) para todas las demás plagas.
DÓNDE USAR	Céspedes, recubrimientos del suelo, maceteros de flores, alrededor de árboles y arbustos, y alrededor de casas.
CUÁNDO USAR	Plagas de superficie: En donde haya insectos Larvas blancas: Desde mayo hasta julio Larva de la tipula paludosa: Aplicar una vez, cuando los insectos adultos estén presentes en grandes cantidades
CUÁNTO USAR	Ver las indicaciones
	Para preguntas o comentarios, llame al número gratuito 1-877-229-3724 o visítenos en línea en www.BioAdvanced.com

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta. Antes de utilizar, lea y siga todas las indicaciones de la etiqueta.

ANTES DE USAR **Restricciones:** • No aplicar cerca de lagunas, estanques, arroyos o lagos con peces. • No usar utensilios de alimentos tales como cucharas o tazas medidoras en ninguna actividad relacionada con la alimentación luego de usarlos con este insecticida. • Mantener a las personas y mascotas lejos del área tratada hasta que se haya regado y se seque. • No usar en huertos. • No aplicar este producto, mediante algún método de aplicación, a lino, lino o a otros especímenes de Tilia. • No aplicar más de 0.4 libras de Imidacloprid por acre por año. Esta bolsa contiene 0.015 libras de Imidacloprid.

CÓMO USAR

TRATAMIENTO EN EL PERÍMETRO DEL HOGAR - CÓMO USAR

PLAGAS Hormigas, chinches, cucarachas, grillos, avispas excavadoras, tijeretas, pulgas, milpiés, cochinitas escorpiones, arañas, termitas^{††}, garrapatas^{††} (incluyendo garrapatas de los ciervos)

CUÁNTO USAR • 1/6 a 1/2 taza por cada 45 a 50 pies (banda de 2 a 6 pies). • Aplicar de 1 a 3 libras por 1,000 pies cuadrados (banda de 10 libras) que es la misma que un campo de césped de 1,000 pies cuadrado - Todas las otras plagas de la lista. • Cubre hasta 1,000 pies cuadrados (una banda de 2 pies de ancho y 5,000 pies de largo). • Si la presión de la plaga es alta, aplicar 3 libras por cada 1,000 pies cuadrados.

CÓMO APLICAR **Alorededor del perímetro externo de la casa** Para mantener estas plagas lejos de su casa, aplique este producto cuando los insectos juveniles en una banda de 2 a 3 pies de ancho y hasta la estructura. Regar completamente luego de aplicar. Para impedir que las plagas causen algún daño, aplicar este producto cuando las plagas son jóvenes y es más fácil matarlas. **CONSEJO:** Un rociador de mano hace el trabajo más fácil.

TRATAMIENTO DE MONTÍCULOS - CÓMO USAR

PLAGAS Hormigas, Avispas excavadoras (Cicada)

CUÁNTO USAR • 1 a 2 cucharaditas (2 preparaciones) por hormiguero o nido de avispas.

CÓMO APLICAR **Para hormigueros de avispas o nido de avispas:** Rociar 1 a 2 cucharaditas (2 preparaciones) de granúlos sobre el nido de avispas u hormiguero. Tratar las avispas a la noche, luego de que vuelven de su nido. Regar completamente luego de aplicar.

PARA CONTROLAR PLAGAS DEL LISTADO DENTRO Y FUERA DEL CÉSPED - CÓMO USAR

PLAGAS Gorgojos de panto azul (Género hyperodes), hormigas, gusanos soldados, cochinitas, atenuas de césped negro, acaros, chinches, gusanos cortadores, larva de la tipula paludosa, pulgas, grillos, saltahojas, coxos, grillos topo, mosquitos, palomillas (polilla del césped), garrapatas^{††} (incluyendo garrapatas de los ciervos), gusanos blancos (incluido las larvas del escarabajo asiático del jardín, atenuas negros del césped, escarabajos, escarabajos japoneses, escarabajos de negro y junco y escarabajos orientales)

CUÁNTO USAR • Aplicar de 1 a 3 libras por cada 1,000 pies cuadrados - hormigas, pulgas y garrapatas. Aplicar 2-3 libras por cada 1,000 pies cuadrados - y otras plagas de la lista. • Ajustar el rociador en la configuración correcta. Consultar la tabla que aparece a continuación. • Esta bolsa cubre 10,000 pies cuadrados (banda de 10 libras) que es la misma que un campo de césped de 100 pies de ancho y 100 pies de largo. • Si la presión de la plaga es alta, aplicar 3 libras por cada 1,000 pies cuadrados. • Para controlar la larva europea del zanahuelo aplicar 3 libras por cada 1,000 pies cuadrados.

CÓMO APLICAR Usar rociadores de tipo gata o manuales para aplicar granúlos de manera pareja sobre el césped, canchales, plantas y alrededores de árboles/arboles. Para asegurarse de cubrir el área de manera uniforme, primero tratar el límite del césped y luego completar en el centro. Hacer pasadas paralelas, caminando a un ritmo constante para asegurar la distribución pareja de los granúlos. Regar de manera cuidadosa dentro del día de su aplicación. Para impedir que los granúlos causen algún daño, aplicar este producto cuando las plagas son jóvenes y es más fácil matarlas.

CONSEJO: Para un mejor control de los gusanos blancos, grillos topes y las larvas europeas del zanahuelo aplicar justo antes de que rompa el huevo. Comuníquese con el Agente de extensión del condado para conocer los fechas ideales de aplicación en su área.

PLAGAS

CÓMO APLICAR

Hormigueros de hormigas de fuego Rociar de manera pareja sobre el hormiguero. Tratar los hormigueros nuevos a medida que aparecen. Regar completamente luego de aplicar.

RESTRICCIONES DE LA APLICACIÓN

• Aplicar este producto directamente en el área del jardín o césped. Área tratada con agua tal como se indica en esta etiqueta. No regar hasta el punto que corra el agua. • No realizar aplicaciones si llueve. • No aplicar este producto en áreas donde el viento o la lluvia no disperse o escurren el pesticida del área de tratamiento. Si se realiza el barrido del producto que se acumula en entradas de auto, veredas, o calles hacia el área tratada del césped o jardín ayude a evitar el escorrentamiento y corra de agua o sistema de drenaje. • Aplique este producto solamente como se especifica en la etiqueta.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Almacenar en el contenedor original en un lugar seco y fresco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un gabinete de almacenamiento cerrado.

CÓMO RESECHAR EL PESTICIDA: Si está vacío: • Contenedor no rellenable. No volver a volver a usar este contenedor.

• Colocar en la basura para ser reciclado si es posible. • Si está parcialmente lleno: • Llamar a la agencia local de desechos sólidos o al 1-877-229-3724 para recibir instrucciones sobre su eliminación. • Nunca colocar el producto sin usar en un drenaje de salida o de entrada.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Riesgos para los seres humanos y animales domésticos

• Dañino si lo traga, inhala o lo absorbe por la piel. • Causa irritación moderada en los ojos. • Evitar contacto con los ojos, piel o ropa. • Lavar las manos cuidadosamente con agua y jabón luego de manipularlo y antes de comer, beber, masticar goma de mascar o usar tabaco. • Quitar y lavar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.

PRIMEROS AUXILIOS

SI SE INGERE: • Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento. • Hacer que la persona beba trago de agua, si puede tragar. • No inducir el vomito a menos que lo indique un médico o un centro de control de envenenamiento. • No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

SI SE INHALA: • Mover a la persona a un lugar fresco. • Si la persona no respira, llamar al 911 o a una ambulancia, luego dar respiración artificial, preferentemente boca a boca, si fuera posible. • Llamar a un centro de control de envenenamiento o a un médico para asesoramiento sobre el tratamiento a seguir.

EN CONTACTO CON LA PIEL: • Sacar la ropa contaminada. • Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15-20 minutos. • Lavar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Las pruebas y las investigaciones han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. El Comprador asume la responsabilidad, en la medida en que esté de acuerdo con la ley vigente, por la falta de rendimiento o seguridad si el producto no es utilizado según las indicaciones de uso.

Garantía de devolución de dinero: no está satisfecho con este producto, gustosamente le devolveremos el valor original de compra.

Distribuido por: SBM Life Science Corp., PO Box 525, Morrisville, NC 27560

BioAdvanced is a registered trademark of SBM Life Science Corp.



6 80073 00268 1