

BIOADVANCED
SCIENCE-BASED SOLUTIONS

SEASON LONG WEED CONTROL for LAWNS CONCENTRATE

The days of multiple applications to kill weeds are over! Just one application of this product's proprietary 2-in-1 formula kills & prevents listed lawn weeds up to 6 months! It delivers Season Long Weed Control that's simple and easy to use and it will not harm your lawn when used as directed. Rainproof in one hour. Control listed weeds in your lawn up to 6 months!

PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if absorbed through skin or if swallowed. • Causes moderate eye irritation.
- Avoid contact with skin, eyes, or clothing. • Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. • Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID +

IF ON SKIN

- Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15 – 20 minutes. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

IF SWALLOWED

- Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

NOTE: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. **You may call toll-free 1-877-229-3763 for medical emergency information.** Active Ingredients: 4.73% 2,4-D, dimethylamine salt (CAS # 2008-39-1), 0.52% Dicamba, potassium salt (CAS # 10007-85-9), 1.10% Mecoprop-p, potassium salt (CAS # 66423-05-0) and 2.63% Isoxaben (CAS # 82558-50-7).

ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This product is toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water. • Drift or runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters or rinsate. • To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. To the extent consistent with applicable law, the Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

EPA Reg. No. 92564-43

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number or this package.

(46) = 88746-MO-1 (57) = 071106-GA-003

BioAdvanced is a registered trademark of SBM Life Science Corp.

Distributed by: SBM Life Science Corp.
PO Box 525, Morrisville, NC 27560

PRESS TO RESEAL


5501419170 190429Y1



For Use in
Hose End or
Pump Style
Tank Sprayers.



WAIT



**FOR
OUTDOOR
RESIDENTIAL
USE ONLY**

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- Protects Your Lawn From Listed Weeds up to 6 Months
- Won't Harm Your Lawn[†]
- Rainproof in 1 Hour



KILLS & PREVENTS

Kills over 200 listed broadleaf weeds such as Dollarweed, Chickweed, Dandelion, Henbit, Clover & Spurge. Prevents listed broadleaf weeds up to 6 Months.

WHEN TO USE

Apply anytime - Spring through Fall (at temperatures between 50-90°F).

WHERE TO USE

ON ESTABLISHED LAWNS without harming lawn grasses
[†](When used as directed; do not use on Carpetgrass, improved varieties of St. Augustinegrass, such as Floratam, Dichondra or desirable clovers.)

HOW TO USE

To prevent new weeds from growing, spray entire area you want protected.
Wait at least 1 hour after applying, then activate preventative weed barrier by watering.
See Directions for Use for further details.

COVERAGE

This bottle treats up to 9,000 sq.ft. (9,000 sq. ft. for Centipede & St. Augustine lawns; 4,500 sq. ft. for Bermudagrass & Zoysia lawns).



For questions or comments, call toll-free 1-877-229-3724, or visit us on-line at www.BioAdvanced.com

ACTIVE INGREDIENTS:

2,4-D, dimethylamine salt (CAS No. 2008-39-1)	4.73%
Isoxaben (CAS No. 82558-50-7)	2.63%
Mecoprop-p, potassium salt (CAS No. 66423-05-0) . .	1.10%
Dicamba, potassium salt (CAS No. 10007-85-9)	0.52%
OTHER INGREDIENTS	91.02%
TOTAL	100.00%

THIS PRODUCT CONTAINS:

0.337 lb 2,4-D acid equivalent (CAS No. 94-75-7)
per gal or 3.94%
0.225 lb Isoxaben (CAS No. 82558-50-7) per gal or 2.63%
0.080 lb Mecoprop-p acid equivalent (CAS No. 16484-77-8)
per gal or 0.94%
0.038 lb Dicamba acid equivalent (CAS No. 1918-00-9)
per gal or 0.44%
Isomer Specific by AOAC Method

EPA Reg. No. 92564-43

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package. (46) = 88746-MO-1 (57) = 071106-GA-003



501419170 190429V1

OPEN
Resealable Label
for Directions &
Precautions

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

BEFORE YOU USE

- Use this product only on established lawns.
- Apply when the air is calm to avoid spray drift onto desirable plants.

HOW MUCH TO USE

- Measure area to be sprayed. Calculate 'square feet' by multiplying length times width.
- For best results, use spray solution immediately. If it is necessary to store, shake vigorously before use. Do not store for more than 3 days.
- **Bermudagrass, Buffalograss, Fescue, Kentucky Bluegrass, Perennial Ryegrass, Zoysiagrass: 3.2 fl. oz. (6 1/2 TBS) in 2 gallons of water treats 500 sq. ft.**
- **Bahiagrass, Centipedegrass, St. Augustinegrass (not for use on improved varieties of St. Augustinegrass, such as Floratam) or mixtures containing one or more of these grasses: 1.6 fl. oz. (3 1/4 TBS) in 2 gallons of water treats 500 sq. ft.**
- Food utensils, such as tablespoons and measuring cups, must not be used for food purposes after use with any pesticide.
- The maximum application rate of this product is 6.4 fl. oz. per 1,000 sq. ft. per application per site. The maximum number of broadcast applications per treatment site is 2 per year.

HOW TO USE Shake Bottle Well Before Use

- **To prevent new weeds from growing, you must spray the entire area you want protected, not just the emerged weeds.**
- **Wait at least 1 hour after applying, then activate preventative weed barrier by watering with 1/4 - 1/2" of irrigation.**

PUMP STYLE TANK SPRAYERS

Best for spraying individual weeds & small areas.

1. Add the appropriate amounts of water & product to sprayer tank.
2. Close sprayer, shake well and pressurize. Adjust nozzle to a coarse spray.
Individual weeds – Hold tip of wand about 12" from weed, aim at center of weed & spray. Also spray the area underneath & around the weed to prevent new weeds from growing.
Small areas – apply evenly over area.
3. Occasionally re-pressurize sprayer as needed to maintain a good spray pattern.



(cont'd)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

HOW TO USE (cont'd)

DIAL-STYLE HOSE-END SPRAYERS

Best for spraying large areas such as the entire lawn.

1. Fill sprayer jar with enough product for the area to be treated. **DO NOT ADD WATER.**

2. Close sprayer and set dial as recommended below:

- **Ortho Dial 'N Spray Settings:**

2.5 oz. for Bermudagrass, Buffalograss, Fescue, Kentucky Bluegrass, Perennial Ryegrass, Zoysiagrass

1.0 oz. for Bahiagrass, Centipedegrass, St. Augustinegrass (not for use on improved varieties of St. Augustinegrass, such as Floratam) or mixtures containing one or more of these grasses.

- **Chameleon Hose-End Sprayer Settings**

1.5 oz. for Bermudagrass, Buffalograss, Fescue, Kentucky Bluegrass, Perennial Ryegrass, Zoysiagrass

4 TSP for Bahiagrass, Centipedegrass, St. Augustinegrass (not for use on improved varieties of St. Augustinegrass, such as Floratam) or mixtures containing one or more of these grasses

TIP: The numbers on dial indicate amount of concentrate per gallon of spray.

3. Hook to garden hose and apply. To avoid contact with the treated area, begin by spraying area farthest from faucet walking backwards as you spray.

4. Pour any unused product back into this original container.



CONCENTRATE PLUS WATER HOSE-END SPRAYERS

Best for spraying large areas such as the entire lawn.

1. Pour product into sprayer jar to the required 'Fluid Ounce' level.

2. Add the appropriate amount of water to the 'Gallons' level.

3. Close sprayer, hook to garden hose, shake well & apply. To avoid contact with the treated area, begin by spraying area farthest from faucet walking backwards as you spray.



FOR BEST RESULTS

WHEN TO APPLY:

- Spray when
 - weeds are small and actively growing
 - temperatures are between 50 - 90°F
- Do not apply while grass is emerging from dormancy.
- Certain hard-to-kill weeds may be retreated in 2 weeks if necessary. Spray individual weeds using this product in a tank sprayer.
- Heavy raking will disturb the weed preventative barrier and reduce the effectiveness of this product.
- Newly seeded lawn may be sprayed after fourth mowing.
- Bare spots may be seeded 60 days after application.

(cont'd)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

FOR BEST RESULTS (cont'd)

MOWING:

- Do not mow for 1 to 2 days after spraying.
- Clippings from the first three mowings should be left on the treated area. Do not use clippings from the treated areas as mulch or compost around flowers, ornamentals, trees, or in vegetable gardens.

WATERING:

- If lawn is dry, water 1 to 2 days before using this product.
- Rain or watering 1 hour after application will not wash away effectiveness.

HOW IT WORKS

This product contains a proven blend of three weed killers to kill existing weeds PLUS a residual herbicide to keep them from coming back for up to 6 months. Weeds begin to wilt & die within hours and are completely dead in 14 – 28 days. And, it won't harm your lawn when used as directed.

KILLS (a "1" indicates Kills & Prevents)

Annual Yellow Sweetclover	Broadleaf Plantain	Clover, Hop ¹
Aster	Broomweed	Clover, Red ¹
Austrian Fieldcress	Buckhorn	Clover, Strawberry ¹
Bedstraw	Buckhorn Plantain	Clover, Sweet ¹
Beggarticks	Bulbous Buttercup	Clover, White ¹
Betony, Florida	Bull Thistle	Cockle
Bindweed, Field	Bullnettle	Cocklebur
Bird Vetch	Burclover	Common Mullein
Bitter Wintercress	Burdock	Creeping Charlie
Bittercress, Hairy ¹	Burning Nettle	Creeping Jenny
Bitterweed	Burweed ¹	Cudweed ¹
Black-eyed Susan	Buttercup	Curly Dock
Black Medic	Buttonweed	Daisy, English
Black Mustard	Canada Thistle	Daisy, Fleabane
Blackseed Plantain	Carolina Geranium	Daisy, Oxeye
Blessed Thistle	Carpetweed	Dandelion ¹
Bloodflower Milkweed	Catchweed Bedstraw	Dichondra
Blue Lettuce	Catnip	Dogbane
Blue Vervain	Catsear	Dogfennel
Bracted Plantain ¹	Chickweed, Common ¹	Dollarweed ¹
Brassbuttons	Chickweed, Mouseear	Elderberry
Bristly Oxtongue	Chicory	False Dandelion ¹
Broadleaf Dock	Cinquefoil	False Flax
	Clover ¹	False Sunflower
	Clover, Crimson ¹	Fiddleneck ¹
		Florida Pusley

(cont'd)

KILLS (a "1" indicates Kills & Prevents) (cont'd)

Frenchweed	Pineywoods Bedstraw	Tall Nettle
Galinsoga	Plains Coreopsis (Tickseed)	Tall Vervain
Goathead	Plantain ¹	Tansy Mustard
Goldenrod	Poison Ivy	Tanweed
Ground Ivy	Poison Oak	Thistle
Gumweed	Pokeweed	Trailing Crownvetch
Hairy Fleabane ¹	Poorjoe	Tumble Mustard
Hawkweed	Prairie Sunflower	Tumble Pigweed
Healall	Prickly Lettuce ¹	Velvetleaf ¹
Heartleaf Drymary	Prickly Sida	Venice Mallow
Heath Aster	Prostrate Knotweed ¹	Virginia Buttonweed
Hedge Bindweed	Prostrate Pigweed	Virginia Creeper
Hedge Mustard	Prostrate Spurge	Virginia Pepperweed ¹
Hemp	Prostrate Vervain	Water Pennywort
Henbit ¹	Puncturevine	Wavyleaf Bullthistle
Hoary Cress	Purslane, Common ¹	Western Clematis
Hoary Plantain	Ragweed ¹	Western Salsify
Hoary Vervain	Red Sorrel	White Mustard
Horsenettle	Redroot Pigweed	Wild Aster
Jimsonweed	Redstem Filaree ¹	Wild Buckwheat
Knawel	Rough Cinquefoil	Wild Carrot
Knotweed	Rough Fleabane ¹	Wild Four-o'clock
Kochia	Russian Pigweed	Wild Garlic
Lambsquarters ¹	Russian Thistle ¹	Wild Geranium
Lespedeza	Scarlet Pimpernel	Wild Lettuce
Mallow ¹	Scotch Thistle	Wild Marigold
Matchweed	Sheep Sorrel	Wild Mustard ¹
Mexicanweed	Shepherdspurse ¹	Wild Onion ¹
Milk Vetch	Slender Plantain	Wild Parsnip
Morningglory	Smallflower Galinsoga	Wild Radish ¹
Mouseear Hawkweed	Smooth Dock	Wild Rape
Mugwort	Smooth Pigweed	Wild Strawberry
Musk Thistle	Sorrel	Wild Sweet Potato
Mustard	Southern Fleabane ¹	Wild Vetch
Narrowleaf Plantain	Sowthistle ¹	Woodsorrel ¹
Narrowleaf Vetch	Spanishneedles	Wooly Croton
Nettle	Speedwell ¹	Wooly Morningglory
Orange Hawkweed	Spiny Amaranth	Wooly Plantain
Oriental Cocklebur	Spiny Cocklebur	Wormseed
Oxalis ¹	Spiny Sowthistle	Yarrow
Parsley-piert ¹	Spotted Catsear	Yellow Rocket
Parsnip	Spotted Spurge ¹	Yellowflower Pepperweed
Pearlwort	Spurweed	
Pennycress	Stinging Nettle	
Pennywort ¹	Strawberry, India Mock	
Pepperweed		
Pigweed ¹		

¹ Kills & Prevents



Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. Do not allow people or pets to enter the treated area until sprays have dried.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE

Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.

CONTAINER HANDLING

If Empty: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available.


If Partly Filled: Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.



Para usar con rociadores con manguera o de tanque con bomb



ESPERAR



SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Protege su césped de las malezas hasta por 6 meses
- No daña el césped
- A prueba de lluvia en 1 hora

MATA Y PREVIENE

Mata más de 200 malezas de hoja ancha como la redondita de agua, yerba del pajarero, diente de león, ortiga muerta, trébol y euforbio. Evita la aparición de malezas de hoja ancha por hasta 6 meses.

CUÁNDO USAR

Aplíquese en cualquier tiempo (de primavera a otoño; temperaturas entre 50 a 90 °F (10 a 32 °C).

DÓNDE USAR

EN JARDINES ESTABLECIDOS sin dañar los céspedes
†(Cuando se usa según las indicaciones; no debe usarse con pasto alfombra, variedades mejoradas de pasto San Agustín, como floratam, oreja de ratón o tréboles deseables).

CÓMO USAR

Para evitar que crezcan nuevas malezas, rociar toda el área que desea proteger. Esperar al menos 1 hora después de la aplicación; luego, regar para activar la barrera preventiva contra las malezas. Consultar las Indicaciones de uso para obtener más detalles.

COBERTURA

Este frasco alcanza para un tratamiento hasta 9,000 pies cuadrados (9,000 pies cuadrados de pasto centipedo y San Agustín; 4,500 pies cuadrados de pasto Bermudas y césped Zoysia).



Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877-229-3724 o visítenos en línea en www.BioAdvanced.com

INGREDIENTES ACTIVOS:

2,4-D, sal dimetilamina (CAS N° 2008-39-1) 4.73%

Isoxaben (CAS N° 82558-50-7) 2.63%

Mecoprop-p, sal de potasio (CAS N° 66423-05-0) 1.10%

Dicamba, sal de potasio (CAS N° 10007-85-9) 0.52%

OTROS INGREDIENTES 91.02%

TOTAL 100.00%

ESTE PRODUCTO CONTIENE:

0.337 libras (153 g) de 2,4-D equivalente ácido

(CAS N° 94-75-7) por galón o 3.94%

0.225 libras (102 g) de isoxaben (CAS N° 82558-50-7)

por galón o 2.63%

0.080 libras (36 g) de mecoprop-p equivalente ácido

(CAS N° 16484-77-8) por galón o 0.94%

0.038 libras (15 g) de dicamba equivalente ácido

(CAS N° 1918-00-9) por galón o 0.44%

Isómero específico por

Métodos AOAC

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

ANTES DE USAR

- Aplicar este producto sólo sobre césped establecido.
- Aplicar cuando el viento esté calmo para evitar que el rocío se esparza sobre las plantas que desee conservar.

CUÁNTO USAR

- Medir el área a rociar. Para calcular los "pies cuadrados" (metros cuadrados), multiplicar el largo por el ancho.
- Para obtener mejores resultados, utilizar la solución de rocío de inmediato. Si es necesario almacenar, agitar vigorosamente antes de usar. No almacenar por más de 3 días.
- **Césped Bermuda, hierba búfalo, cañuela, pasto azul de Kentucky; ballico perenne, césped Zoysia: 3.2 onzas líquidas (100 cc) (6 1/2 cucharadas) en 2 galones (8 litros) de agua tratan 500 pies cuadrados (45 metros cuadrados).**
- **Césped Bahía, hierba Centipede, césped San Agustín (no usar en variedades mejoradas del césped San Agustín como Floratam) o mezclas que contengan uno o más de estos céspedes: 1.6 onzas líquidas (50 cc) (3 1/4 cucharadas) en 2 galones (8 litros) de agua tratan 500 pies cuadrados (45 metros cuadrados).**
- Los utensilios de cocina, como cucharas y tazas medidoras, no deben utilizarse para preparar alimentos luego de ser utilizados con insecticidas.
- La tasa máxima de aplicación de este producto es de 6.4 onzas líquidas (190 cc) cada 1,000 pies cuadrados (90 metros cuadrados) de aplicación por sitio. La cantidad máxima de aplicaciones al voleo por sitio de tratamiento es de 2 por año.

CÓMO USAR Agitar bien la botella antes de usar

- **Para evitar que crezcan nuevas malezas, debe rociar el área completa que desea proteger, no sólo las malezas que ya surgieron.**
- **Esperar al menos 1 hora después de aplicar, luego activar una barrera preventiva contra las malezas regando con una irrigación de 1/4 a 1/2" (0.5 a 1.5 cm).**

ROCIADORES DE TANQUE ESTILO BOMBA

Los más adecuados para rociar malezas individuales y pequeñas áreas.

1. Agregar las cantidades adecuadas de agua y producto en el tanque del rociador.

2. Cerrar el rociador, agitar bien y presurizar. Ajustar la boquilla en modo de rocío grueso.

Malezas individuales: sostener la punta de la varilla a aproximadamente 12 pulgadas (30 cm)

de la maleza, apuntar al centro de la maleza y rociar. Además, rociar el área debajo y alrededor de la maleza para evitar que crezcan nuevas malezas.

Pequeñas áreas: aplicar uniformemente sobre el área.

3. De vez en cuando, volver a presurizar el rociador según sea necesario para mantener un buen patrón de rociado.

ROCIADORES DE DISCO CON MANGUERA

Los más adecuados para rociar grandes áreas tales como el césped completo.

1. Llenar la jarra del rociador con suficiente producto para el área a tratar. NO AGREGAR AGUA

2. Cerrar el rociador y colocar el dial como se recomienda abajo:

- **Configuración del Ortho Dial 'N Spray:**

2.5 onzas para césped Bermuda, césped búfalo, cañuela, césped azul Kentucky, raigrás perenne, césped zoysia



(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

CÓMO USAR (continuación)

ROCIADORES DE DISCO CON MANGUERA (continuación)

1.0 onza para césped bahía, césped cienpiés, césped San Agustín (no para uso en variedades mejoradas del césped San Agustín, tal como Floratam) o mezclas que contengan una o más variedades de estos céspedes.

- **Configuración del rociador Chameleon de extremo de manguera:**

1.5 onzas para césped Bermuda, césped búfalo, Cañuela, césped azul Kentucky, Raigrás perenne, césped zoysia

4 cucharadas para césped bahía, césped cienpiés, césped San Agustín (no para uso en variedades mejoradas del césped San Agustín, como Floratam) o mezclas que contenga uno o más de estos céspedes.

CONSEJO: El número en el dial indica la cantidad de concentrado por galón de rocío.

3. Colocar la manguera del jardín y aplicar. Para evitar contacto con el área tratada, comience por rociar el área más lejana del grifo y camine hacia atrás a medida que rocía

ROCIADORES CON MANGUERA PARA TRATAR CON CONCENTRADO Y AGUA

Los más adecuados para grandes áreas tales como el césped completo.

1. Verter el producto en el envase del rociador hasta el nivel de "Onzas líquidas" necesarias.

2. Agregar la cantidad correspondiente de agua hasta el nivel de "Galones".

3. Cerrar el rociador, conectar a la manguera del jardín, agitar bien antes de aplicar. Para evitar el contacto con el área tratada, comenzar a rociar el área más alejada del grifo y caminar hacia atrás a medida que aplica el producto.



PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

CUÁNDO APLICAR:

- Rociar cuando
 - las malezas son pequeñas y están en crecimiento activo
 - las temperaturas oscilan entre 50 y 90 °F (10 °C y 32 °C)
- No aplicar mientras el césped retorna del letargo.
- Es posible que determinadas malezas difíciles de eliminar deban volver a tratarse en 2 semanas, si fuera necesario. Rociar las malezas individuales utilizando este producto en un rociador de tanque.
- Rastrillar excesivamente alterará la barrera preventiva de malezas y reducirá la eficacia de este producto.
- El césped recién sembrado puede rociarse después de segar por cuarta vez.
- Los puntos descubiertos pueden sembrarse 60 días después de la aplicación.

SEGADO:

- No segar por 1 ó 2 días después de rociar.
- Los recortes de césped de los primeros tres segados deben dejarse en el área tratada. No utilizar los recortes de las áreas tratadas como mantillo o abono orgánico alrededor de flores, plantas ornamentales, árboles o en jardines de hortalizas.

RIEGO:

- Si el césped está seco, regar 1 ó 2 días antes de utilizar este producto.
- La lluvia o riego una hora después de la aplicación no afectará la eficacia del producto.

CÓMO FUNCIONA

Este producto contiene una mezcla probada de tres herbicidas para matar las malezas existentes ADEMÁS de un herbicida residual para evitar que regresen hasta por 6 meses. Las malezas comienzan a marchitarse y mueren en horas y están completamente muertas en 14 a 28 días. Y no daña su césped cuando es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

MATA (un "1" significa Mata y previene)

Trébol amarillo	Cerastium vulgatum	Antoñico	Verbena bracteata
Aster	Endivia	Llantén media	Abrojos
Rorippa austriaca	Tormetilla	Verbena stricta	Verdolaga ¹
Galium	Trébol ¹	Solanum de Carolina	Ambrosia ¹
Aceitilla	Trébol encarnado ¹	Belladona	Rumex acetosella
Stachys floridana	Trifolium agrarium ¹	Escleranto	Yuyo colorado
Manto blanco	Trébol rojo ¹	Sanguinaria	Alfilerillo ¹
Vicia cracca	Trébol fresa ¹	Morenita	Potentilla norvegica
Berro de altura	Trébol dulce ¹	Cenizos ¹	Erigeron asperugineus ¹
Falso berro ¹	Trébol blanco ¹	Lespedeza	Axyris amaranthoides
Helenium tenuifolium	Berbecho	Malva ¹	Cardo ruso ¹
Alma del poeta	Bardana menor	Escobilla	Pimpinela escarlata
Lupulina	Barbasco	Caperonia castaneifolia	Cardo escocés
Mostaza negra	Pilea nummulariifolia	Astrágalo	Amargosa
Plántago rugelii	Lysimachia nummularia	Campanilla	Bolsa del pastor ¹
Cardo santo	Vira Vira ¹	Oreja de ratón	Plantago heterophylla
Hierba de la cucaracha	Romaza	Artemisa	Galinsoga parviflora
Lechuga azul	Margarita menor	Cardo pendiente	Rumex altissimus
Verbena azul	Erigeron philadelphicus	Mostaza	Amaranthus hybridus
Plántago aristata ¹	Margarita mayor	Plántago de hoja	Acedera
Cotula	Diente de león ¹	delgada	Erigeron quercifolius ¹
Cardo perruno	Dichondra	Veza común	Achicoria ¹
Lengua de vaca	Verdolaga de la montaña	Ortiga	Bidens bipinnata
Plántago mayor	Manzanilla cimarrona	Naranja de la vellosilla	Verónica ¹
Gutierrezia dracunculoides	Sombrero de agua ¹	Bardana menor	Bledo espinoso
Tritogonia verrucosa	Baya del saúco	Oxalis ¹	Cepa caballo
Llantén menor	Falso diente de león ¹	Alquimila arvense ¹	Cerraja brava
Hierba velluda	Camelina	Chirivía	Pasto del chanco
Cardo negro	Falso girasol	Sagina procumbens	Euphorbia maculata ¹
Mala mujer	Amsinckia menziesii var ¹	Carrasque	Soliva sessilis
Trébol de carretilla	Botoncillo	Obolaria virginica ¹	Ortiga mayor
Bardana	Carrasque	Lentejilla	Fresa de la India
Ortiga mayor	Galinsoga	Bledo ¹	Urtica procera
Cadillo ¹	Abrojos	Pineywoods Bedstraw	Verbena lila
Celidonia menor	Vara de oro	Coreopos tinctoria	Pamita
Hierba del soldado	Hiedra de tierra	(pilosa de Bidens)	Polígono anfibio
Calcida vera	Pegapega	Plántago ¹	Cardo
Geranio	Rama negra ¹	Hiedra venenosa	Coronilla varia
Verdolaga alfombra	Flor de peña	Roble venenoso	Nabo chileno
Galium aparine	Cola de ratón	Hierba carmín	Quelite
Hierba gatera	Cinquillo	Diodia teres	Malva blanca ¹
Hierba del halcón	Aster ericoides	Girasol silvestre	Hibisco
Capiqui común ¹	Campanilla blanca	Lactuca serviola ¹	Diodia virginiana
	Erísimo	Afata hembra	Parra virgen
	Cáñamo común	Centinodia ¹	Lentejilla ¹
	Ortiga mansa ¹	Bledo rojo	Centella asiática
		Hierba de golondrina	Wavyleaf Bullthistle
			Clemátide

Salsafi	Maravilla	Chirivía silvestre	Croton capitatus
Mostaza blanca	Ajo silvestre	Rábano silvestre ¹	Palo de rosa
Aster silvestre	Geranio silvestre	Colza silvestre	Hierba del pastor
Enredadera	Lechuga silvestre	Fresa silvestre	Chenopodium aristatum
(Polygonum	Caléndula silvestre	Batata silvestre	Milenrama
convolvulus)	Mostaza silvestre ¹	Vicia americana	Hierba de Santa Bárbara
Zanahoria silvestre	Cebolla silvestre ¹	Oxalis montana ¹	Mastuerzo

¹Mata y previene



No aplicar este producto de manera que entre en contacto con personas o mascotas, directamente o a través del escurrimiento. Mantener a las personas y a las mascotas alejadas del área durante la aplicación. No permitir a las personas ni a las mascotas ingresar al área tratada hasta que el rocío se haya secado.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Almacenar en el contenedor original y en un lugar fresco y seco fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave. Proteger del congelamiento

MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR

Si está vacío: Contenedor no reusable. No volver a utilizar ni rellenar este contenedor. Colocarlo en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.

Si está parcialmente lleno: Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación. Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Riesgos para seres humanos y animales domésticos

- Es perjudicial si se absorbe por la piel o se ingiere.
- Causa irritación moderada en los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón después de manipular este producto y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, fumar o ir al baño.
- Quitarse y lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

(continuación)

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL

- Quitar la ropa contaminada.
- Enjuagar la piel de inmediato con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para mayores consultas sobre el tratamiento.

EN CASO DE INGESTIÓN

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.
- Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar.
- No inducir el vómito a menos que lo indique un centro de control de envenenamiento o el médico.
- No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos.
- Retirar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, y luego continuar enjuagando los ojos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para mayores consultas sobre el tratamiento.

NOTA: Tener el contenedor o la etiqueta del producto a mano al llamar a un médico, un centro de control de envenenamiento o al concurrir a un tratamiento.

Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763.

Ingredientes activos: 4.73% 2,4-D, sal dimetilamina [CAS N° 2008-39-1], 0.52% dicamba, sal de potasio [CAS N° 10007-85-9], 1.10% mecoprop-p, sal de potasio [CAS N° 66423-05-0] y 2.63% isoxaben [CAS N° 82558-50-7].

RIESGOS AMBIENTALES

- Este producto es tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. No aplicar directamente al agua.
- El rocío y el escurrimiento pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos presentes en las aguas adyacentes a las áreas tratadas. No contaminar el agua al eliminar el agua de lavado o enjuague del equipo.
- Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar que ingrese en cursos de agua o sistemas de desagüe.

NOTA: Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. En la medida que sea acorde con la ley pertinente, el Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.