

ROTHER CYSTICARE - UTIPRO® PLUS

ROTHER

Toepassing:

Roter Cysticare - Utipro® Plus is een medisch hulpmiddel voor het bedwingen en voorkomen van cystitis (blaasontsteking), veroorzaakt door ziekteverwekkers als E. Coli en andere gramnegatieve bacteriën, die vaak betrokken zijn bij blaasontstekingen.

Roter Cysticare - Utipro® Plus moet oraal ingenomen worden, zodra de eerste symptomen van een urinewegstoornis optreden: dan helpt het de vermenigvuldiging van ziekteverwekkers tegen te gaan en het risico op infecties te verminderen. Bij herinfectie van Roter Cysticare - Utipro® Plus nieuwe episodes voorkomen, door de vermenigvuldiging van de ziekteverwekkers, die verantwoordelijk zijn voor de blaasontstekingen, te beperken.

De samenstelling, gebaseerd op gelatine en xyloglucaan (Hemicellulose), heeft een mechanisch effect op de holtes in de darm (darmlumen). Hierdoor wordt het contact van ziektekiemen met de darmwand vermeden en wordt de eerste stap in verspreiding van ziektekiemen en verdere doorgang naar de urinewegen voorkomen.

Verschijningsvorm:

Blisterverpakking met 15 of 30 capsules.

Samenstelling:

Elke capsule bevat: 100 mg xyloglucaan, 50 mg gelatine (afkomstig van varkens), 100 mg propolis, 100 mg hibiscus sabdariffa, siliciumdioxide, magnesiumstearaat (plantaardig) en maïszetmeel.

Dosering:

Zodra de eerste symptomen van urinair ongemak optreden, moet Roter Cysticare - Utipro® Plus oraal worden ingenomen in een dosering van 2 capsules per dag (1 capsule elke 12 uur) gedurende 5 dagen.

Ter preventie van herinfectie moet 1 capsule per dag worden ingenomen gedurende minimaal 15 opeenvolgende dagen per maand. Zo nodig kan de behandeling worden herhaald.

Gebruiksaanwijzing:

Slik de capsule door met een vloeibare drank.

Waarschuwingen:

- De diagnose blaasontsteking moet door een arts worden gesteld. Als de symptomen langer dan 5 dagen aanhouden, raadpleeg dan uw arts.
- Voor een acute blaasontsteking is wellicht behandeling met antibiotica nodig. Dit product heeft geen bacteriedodende of bacteriostatische eigenschappen en kan derhalve een behandeling met antibiotica niet vervangen. Roter Cysticare - Utipro® Plus kan echter wel gelijktijdig met antibiotica worden toegediend.
- Het wordt aangeraden het product niet te gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding, tenzij anders aangegeven door een professionele zorgverlener.
- Gebruik dit product niet na de vervaldatum die op de verpakking staat.
- Gebruik het product niet als de blisterverpakking geopend of beschadigd is.
- Niet bewaren boven 25°C.
- Niet invriezen.
- Het product buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Contra-indicaties:

Roter Cysticare - Utipro® Plus mag niet worden gebruikt door personen met een bekende overgevoeligheid voor xyloglucaan, gelatine of de andere bestanddelen van dit product.

Fabrikant:

NOVENTURE, S.L.
Avenida Diagonal, 549, 5ª planta
08029 Barcelona - Spanje.

Distributeur:

Imgroma B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen, Nederland

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst goedgekeurd in september 2019.
Rev. 04: 01.09.2019

