

VALDISPERT[®]

45 mg

INFORMATIE

Deze bijsluiter bevat essentiële informatie over Valdispert 45 mg. In deze bijsluiter leest u hoe u dit geneesmiddel het best kunt gebruiken. Ook als u Valdispert 45 mg al eerder heeft gebruikt, is het zinvol de bijsluiter te lezen: er kan nieuwe informatie in staan.

SAMENSTELLING

Valdispert 45 mg bevat 45 mg valerianaextract per dragee. De volgende hulpstoffen zijn verwerkt: lactose monohydraat, Macrogol 4000, microcrystallijne cellulose, watervrije colloïdale siliciumdioxide, magnesiumstearaat, schellak, hypromellose (3 mPas), talk, lichte magnesiumoxide, arabische gom, sucrose, polyvinylpyrrolidon, Macrogol 6000, titaandioxide (E171), natriumcarmellose, bijenwas en carnaubawas.

Valdispert 45 mg heeft kalmerende eigenschappen. Het maakt niet suf.

INHOUD

Valdispert 45 mg is verkrijgbaar in een flacon met 100 dragees.

REGISTRATIEHOUDER

Vemedica Manufacturing B.V., Verrijn Stuartweg 60 – 1112 AX Diemen

Voor meer informatie: bel 0900 233 36 66 (€0,15/min)


Valdispert 45 mg staat in het register van geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 02570.

INDICATIE

Bij lichte vormen van nervositeit en spanning. Valdispert 45 mg behoort tot de groep rustgevendende geneesmiddelen.

NIET GEBRUIKEN BIJ

Valdispert 45 mg mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.



VALDISPERT[®]

WAARSCHUWING

Gebruik dit geneesmiddel als u zwanger bent of borstvoeding geeft, alleen na overleg met uw arts.

Voorzover bekend kan Valdispert 45 mg zonder gevaar voor de vrucht overeenkomstig het voorschrift gebruikt worden.

Valdispert 45 mg heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

DOSERING

Naar behoefte drie maal daags 1–3 dragees met water innemen.

Dragees in het geheel doorslikken.

Neem contact op met uw arts als u dit geneesmiddel langer dan 14 dagen wilt gebruiken.

In het geval van een éénmalige overdosering zijn er geen overdoseringsverschijnselen bekend.

Indien een keer vergeten wordt Valdispert 45 mg in te nemen, wacht dan tot de volgende dosis genomen zal worden. Neem dan niet meer dan de gewone hoeveelheid in.

BIJWERKINGEN

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten, zogenaamde bijwerkingen. Van Valdispert 45 mg zijn nog nooit bijwerkingen bewezen. Indien u vermoedt dat er toch bijwerkingen optreden, waarschuw dan uw arts.

BEWAREN

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren. Op de verpakking staat de uiterste gebruiksdatum. Valdispert 45 mg niet bewaren boven de 25 °C. Na openen van de flacon is Valdispert 45 mg nog 6 maanden houdbaar.

De bijsluiters zijn voor het laatst herzien in: maart 2017

734035 03/17



 Intergrafipak B.V. Postbus 245 NL-2150 AE Nieuw-Vennep Boekweitstraat 45 NL-2153 GK Nieuw-Vennep Telefoon +31 (0)252 66 02 40 Fax +31 (0)252 63 23 37 E-mail info@intergrafipak.nl	Artikelinformatie Formaat : 100 x 148 mm Vouwmaat : 100 x 27 mm Farmcode : 34035 Gebruikte corps : Gebruikte regelafstand :		Naam aanvrager: Ben van de Kleef Deze standproef is niet maatgevend voor drukkleur, papierkwaliteit en afmetingen. De productie start pas na ontvangst van uw akkoord. (*bij manuaalfilm is afmeting wel maatgevend)
i 100 % CONTROLE VEREIST i Klantnaam : Vernedia Manufacturing B.V. Artikelnummer : 734035 03/17 Ordernummer : Versie drukproef : 1 F090.1111	Gebruikte kleuren  validispet oranje  pms 4695		Datum: Paraaf klant: ☐ Proef ☐ Revisie ☐ Akkoord ☐ Proef