

PRIODERM®

Dimeticon lotion

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u Prioderm Dimeticon Lotion gebruikt.

Wat is Prioderm Dimeticon Lotion?

Prioderm Dimeticon Lotion is een anti-hoofdluislotion die hoofdluizen doodt aan de hand van een fysiek werkingsmechanisme (namelijk verstikking) en de ontwikkeling van neten tegengaat. Prioderm Dimeticon Lotion kan gebruikt worden bij **volwassenen** en **kinderen** vanaf de leeftijd van **2 jaar**. Prioderm Dimeticon Lotion is gemakkelijk te gebruiken en heeft aangetoond al binnen 5 minuten te werken*. Het haar wassen en kammen na de behandeling met Prioderm Dimeticon Lotion helpt om hoofdluis en neten te verwijderen. Hoofdluizen kunnen niet resistent worden voor Prioderm Dimeticon Lotion aangezien de lotion de luizen doodt door middel van verstikking.

Prioderm Dimeticon Lotion bevat geen insecticiden.

Prioderm Dimeticon Lotion bestaat uit:

1. Fles met Prioderm Dimeticon Lotion, 100 ml.
Bestanddelen:
Dimethicon (99,4% w/w), tocoferylacetaat, Prunus Armeniaca Kernel Olie (abrikozenpitolie), Prunus Amygdalus Dulcis Olie (amandelolie).
2. Roestvrijstalen kam met fijne tanden.
3. Gebruiksaanwijzing met informatie over hoofdluis en hoe Prioderm Dimeticon Lotion te gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

Wat is hoofdluis?

Hoofdluizen zijn bloedzuigende insecten zonder vleugels. Het zijn parasieten die zich voeden met bloed van mensen. Hoofdluizen en neten (luizeneitjes) worden vaak achter de oren, langs de

haarlijn en in de nek aangetroffen, omdat deze plekken warm en donker zijn. De kleur van de hoofdluis kan uiteenlopen van zandkleurig tot bijna zwart. Nadat ze zich gevoed hebben met bloed, verkleuren ze naar donkerrood. Een volwassen hoofdluis is 2-4 mm lang. De neten zijn nauwelijks 1 mm groot en zijn wit. Ze kunnen lijken op zandkorrels of roos en worden gevonden op het haar dat zich het dichtst bij de hoofdhuid bevindt. De levenscyclus van de hoofdluis kent drie stadia: neten, nimfen en volwassen luizen. De volwassen vrouwtjesluis kleeft de neten in het haar vast met een soort lijm, niet meer dan 1 mm van de hoofdhuid. Neten blijven stevig aan het haar zitten, wat betekent dat de afstand tot de hoofdhuid toeneemt naarmate het haar groeit. Na maximaal 10 dagen komt er een nimf uit de neet. Na maximaal 12 dagen is deze nimf een volwassen luis geworden. De totale levenscyclus van neet tot volwassen luis duurt ongeveer drie weken. Besmetting met hoofdluis treedt normaal gesproken op door direct contact en wordt gewoonlijk onder kinderen verspreid tijdens het spelen. Petten, sjaals, borstels en dergelijke voorwerpen kunnen uiteraard ook besmetting overdragen als deze binnen korte tijd door kinderen worden gedeeld.

Hoe wordt Prioderm Dimeticon Lotion gebruikt?

Volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor de bestrijding van hoofdluis.

1. Breng Prioderm Dimeticon Lotion aan op droog haar

Leg voordat u begint een lichtgekleurd handdoek over de schouders van de te behandelen persoon. Draai het dopje van de punt van de applicatorfles. Breng de lotion met de applicatortip gelijkmatig over de gehele hoofdhuid aan. Werk vanaf het voorhoofd richting de kruin. Ga verder naar beneden van de kruin naar de oren en van de kruin naar de achterkant van de nek. Masseer Prioderm Dimeticon Lotion grondig in de hoofdhuid en in het hele haar in. Breng een royale hoeveelheid Prioderm Dimeticon Lotion aan om al het haar van de hoofdhuid tot aan de haarpunten te bedekken. Masseer goed in, van de haarwortels tot de haarpunten en besteed daarbij met

name aandacht aan het gebied achter de oren en de achterkant van de nek. De benodigde hoeveelheid lotion is afhankelijk van de haarlengte en het type haar. Voor de behandeling van haar op schouderlengte is 30-50 ml lotion nodig.

2. Laat Prioderm Dimeticon Lotion ten minste 15 minuten inwerken

Gedurende deze tijd gaan de hoofdluizen dood. Neten die worden blootgesteld aan Prioderm Dimeticon Lotion worden belemmerd in hun ontwikkeling en velen komen mogelijk niet uit, zoals klinisch is bewezen.

3. Was Prioderm Dimeticon Lotion uit met gewone shampoo

Breng een ruime hoeveelheid shampoo zonder water aan en masseer deze in het haar. Spoel daarna het haar uit met water. Indien nodig kan het wassen met shampoo worden herhaald om te voorkomen dat het haar na de behandeling vet aanvoelt. Bij lang haar wordt aanbevolen om een conditioner te gebruiken om het kammen te vergemakkelijken.

4. Kam het natte haar grondig uit

Gebruik de meegeleverde netenkam om dode hoofdluizen te verwijderen. Kam elk deel van het haar systematisch door. Zorg voor goede lichtomstandigheden tijdens het kammen, bijv. daglicht. Het wordt aanbevolen het haar in vier delen te verdelen (van het voorhoofd tot de achterkant van de nek en van het ene oor tot het andere) en elk deel afzonderlijk uit te kammen: a) pak een pluk haar van één van de delen vast, kam het van de haarwortels tot de haarpunten uit en houd de luis-/neetvrije pluk vervolgens apart. b) Spoel of veeg de kam na elke kambeweging af met een wattenschijfje om dode hoofdluizen te verwijderen. c) ga verder met een volgende pluk totdat het deel vrij is van luizen en neten; behandel de andere delen ook op deze manier. Kam altijd vanaf de haarwortels naar de haarpunten. De neten moeten mogelijk met de hand uit het haar worden verwijderd.

5. Herhaal de behandeling na 9-10 dagen

Herhaal stap 1 tot 4 na 9-10 dagen om de uitgekomen neten te bestrijden. Dit zorgt ervoor dat de levenscyclus van de

Teksten corps= 7 pt

endochters



Product:
Bijsluiter Prioderm Dimeticon Lotion 100 ml + luizenkam

Formaat verpakking:
140 x 190 mm

Klant:
Cooper Consumer Health Nederland

Versie:
6

Datum:
30-09-2025

Bijzonderheden:
25.238

Kleuren:

 

Black Stansvorm

NOT FINAL

hoofdluis volledig wordt doorbroken, wat erg belangrijk is, ook al belemmert Prioderm Dimeticon Lotion de ontwikkeling van neten.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Volwassenen kunnen de behandeling zelf uitvoeren, maar iemand om hulp vragen met het aanbrengen van de lotion en het uitkammen van het haar kan de resultaten verbeteren.
- Als meerdere gezinsleden besmet zijn met hoofdluis, behandel dan alle besmette gezinsleden op dezelfde dag met Prioderm Dimeticon Lotion om herbesmetting te voorkomen. Gebruik de meegeleverde netenkam om het haar van andere gezinsleden te controleren op hoofdluisen.
- Als er opnieuw een besmetting optreedt tussen de eerste en de tweede behandeling (bijv. door direct contact met personen die besmet zijn met hoofdluis), behandel dan opnieuw met Prioderm Dimeticon Lotion. Herhaal na 9-10 dagen. Het product is veilig indien gebruikt volgens gebruiksaanwijzing.
- Prioderm Dimeticon Lotion is geschikt voor zowel **volwassenen** als **kinderen** vanaf **2 jaar**.
- Er zijn geen risico's bekend bij het gebruik van Prioderm Dimeticon Lotion tijdens de zwangerschap en borstvoeding; het wordt echter aanbevolen om vóór gebruik een arts of apotheker te raadplegen.
- Het gebruik bij kinderen moet worden uitgevoerd door een volwassene.
- Als Prioderm Dimeticon Lotion op de vloer of een ander oppervlak wordt gemorst, kan deze glad worden.
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik, niet inslikken. Neem bij inslikken contact op met uw arts of een huisartsenpost. Houd de verpakking bij de hand om de arts te helpen het product te identificeren.
- Gebruik Prioderm Dimeticon Lotion niet na de houdbaarheidsdatum.
- Niet gebruiken als de verpakking vóór gebruik is beschadigd.
- Prioderm Dimeticon Lotion kan lichte oogirritatie veroorzaken. Contact met ogen vermijden. Als de lotion toch in contact komt met de ogen, moet u deze goed spoelen met water.

Contra-indicaties en ongewenste bijwerkingen

- Prioderm Dimeticon Lotion kan jeuk of irritatie op de hoofdhuid of in de nek veroorzaken.
- Prioderm Dimeticon Lotion mag niet worden gebruikt op of door personen die gevoelig zijn vóór een van de bestanddelen. Als u twijfelt, probeer Prioderm Dimeticon Lotion dan voor het eerste gebruik uit op een klein stukje huid.
- Stop het gebruik en raadpleeg uw arts als u een gevoelige of allergische reactie of een andere ongewenste bijwerking ervaart. Neem in het geval van ernstige incidenten onmiddellijk contact op met Cooper Consumer Health NL B.V., Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen.

Interacties

Er worden geen interacties met andere producten verwacht, aangezien de ingrediënten van Prioderm Dimeticon Lotion niet systemisch worden geabsorbeerd of worden opgenomen in de diepere lagen van de epidermis en de blootstellingstijd aan het product beperkt is.

Bewaren

Bewaar het product bij 2-30 °C, op een veilige plaats en buiten het bereik en zicht van kinderen. Uit het zonlicht houden. Draai na het aanbrengen de kleine dop stevig op de punt van de applicatorfles en bewaar deze samen met de gebruiksaanwijzing in de originele verpakking.



Lotnummer



Lees de gebruiksaanwijzing



Waarschuwing, raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Bewaarcondities



Uit het zonlicht houden



Uiterste houdbaarheidsdatum



Fabrikant



CE-markering (medisch hulpmiddel)



Meda Pharma S.p.A.
Via Valosa di Sopra 9 - 20900 Monza, Italië

Distributeur: Cooper Consumer Health NL B.V.,
Verrijn Stuartweg 60 1112 AX Diemen

*Wetenschappelijk bewezen effectief tegen luizen en neten - in-vitrostudie.

Laatste wijziging: september 2025
CLEJN100NL/A

