



Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

VALDISPERT®

Valdispert melatonine 3 mg tabletten Valdispert melatonine 5 mg tabletten melatonine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit medicijn gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u.

- Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter beschreven of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld.
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.
 - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw apotheker.
 - Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
 - Wordt uw klacht na 6 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is Valdispert melatonine en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?
2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
3. Hoe neemt u dit medicijn in?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit medicijn?
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

1. Wat is Valdispert melatonine en waarvoor wordt dit medicijn ingenomen?

De werkzame stof in Valdispert melatonine is melatonine. Deze stof behoort tot een natuurlijke groep hormonen die door het lichaam worden aangemaakt.

Valdispert melatonine wordt gebruikt voor kortdurende behandeling van jetlag bij volwassenen. Met jetlag worden de door tijdsverschil veroorzaakte klachten bedoeld door het reizen in verschillende tijdzones (door in oostelijke of westelijke richting te reizen).

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

2. Wanneer mag u dit medicijn niet innemen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet innemen?

- U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6 van deze bijsluiter.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

- Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn inneemt als u last heeft van:
- een verminderde werking van de nieren. Het innemen van dit medicijn wordt niet aanbevolen als u een ernstige nierziekte heeft
 - een verminderde werking van de lever. Het innemen van dit medicijn wordt niet aanbevolen als u een leverziekte heeft
 - een auto-immuunziekte (uw lichaam wordt dan ‘aangevallen’ door uw eigen afweersysteem). Het innemen van melatonine wordt in dit geval niet aanbevolen
 - een aandoening van het hart of de bloedvaten waarvoor u bloeddrukverlagende medicijnen gebruikt. Het innemen van melatonine wordt in dit geval niet aanbevolen.

Het tijdstip van de inname van melatonine is belangrijk. Valdispert melatonine moet volgens de aanwijzingen worden gebruikt. Valdispert melatonine kan ervoor zorgen dat u zich slaperig voelt. U moet voorzichtig zijn als u last heeft van de slaperigheid, aangezien dit uw vermogen om bepaalde activiteiten uit te voeren, zoals autorijden, kan verminderen.

Roken kan de werking van dit medicijn verminderen. De stoffen in tabaksrook kunnen namelijk de afbraak van melatonine door de lever verhogen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geef dit medicijn niet aan kinderen of jongeren tot 18 jaar. Bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is dit medicijn niet getest en zijn de effecten ervan onbekend.

Neemt u nog andere medicijnen in?

Neemt u naast Valdispert melatonine nog andere medicijnen in, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt onder meer voor de volgende andere medicijnen:

- fluvoxamine (gebruikt voor de behandeling van depressie en dwangstoornissen), chinolonen en rifampicine (gebruikt bij de behandeling van bacteriële infecties), oestrogenen (gebruikt om een zwangerschap te voorkomen of bij hormoonsuppletie therapie (hormoonbehandeling tegen bijvoorbeeld overgangsklachten), carbamazepine (gebruikt bij de behandeling van epilepsie) en 5- of 8-methoxypsoralen (5-MOP en 8-MOP) (gebruikt bij de behandeling van huidziekten zoals psoriasis)
- adrenerge agonisten/antagonisten (zoals bepaalde soorten medicijnen die worden gebruikt om de bloedvaten te laten samentrekken om zo de bloeddruk te reguleren, neussprays of neusdruppels tegen een verstopte neus, bloeddrukverlagende medicijnen), opiaatagonisten/-antagonisten (zoals medicijnen die worden gebruikt bij de behandeling van een drugsverslaving), prostaglandineremmers (zoals niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen), antidepressiva, tryptofaan en alcohol
- cimetidine (gebruikt voor de behandeling van maagproblemen zoals maagzweren), calciumkanaalblokkers (medicijnen die worden gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk en plotselinge pijn op de borst [angina pectoris], zoals nifedipine)
- benzodiazepinen en niet tot de benzodiazepinen behorende hypnotica (medicijnen die worden gebruikt om slaap op te wekken, zoals zaleplon, zolpidem en zopiclon)
- thioridazine (voor de behandeling van schizofrenie) en imipramine (voor de behandeling van depressie)
- warfarine en andere antistollingsmiddelen zoals dabigatran, rivaroxaban, apixaban, edoxaban (gebruikt om bloedstolling tegen te gaan) - om beter te kunnen beoordelen of deze medicijnen gebruikt kunnen worden, kan controle van de INR-waarde (dat aangeeft hoe snel het bloed stolt) nodig zijn.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Eten kan de effectiviteit van dit medicijn veranderen. Het advies is om niets te eten in de 2 uur vóór en in de 2 uur na het geplande moment van inname van melatonine. Drink geen alcohol voordat, terwijl of nadat u dit medicijn inneemt aangezien alcohol de effectiviteit van dit medicijn vermindert en het kan bepaalde symptomen van jetlag (zoals hoofdpijn, vermoeidheid in de ochtend, verminderde concentratie) mogelijk verergeren.

Zwangerschap en borstvoeding

Het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen. U mag dit medicijn niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit medicijn heeft matige invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Melatonine kan onder andere slaperigheid veroorzaken. Na inname van melatonine kunt u enkele uren minder alert zijn. Bestuur geen voertuig en bedien geen machines nadat u melatonine heeft ingenomen.

3. Hoe neemt u dit medicijn in?

Neem dit medicijn altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is dagelijks één tablet van 3 mg gedurende maximaal 4 dagen. De eerste dosis moet worden ingenomen bij aankomst op de plaats van bestemming op uw gebruikelijke bedtijd (lokale tijd). De dosis op de dagen erna moet ook op uw gebruikelijke bedtijd worden ingenomen. Als de standaarddosis van 3 mg de symptomen niet genoeg vermindert, kan in plaats van de tablet van 3 mg één tablet van 5 mg worden ingenomen op de lokale bedtijd. De tablet van 5 mg mag niet extra worden ingenomen naast de tablet van 3 mg, maar een hogere dosis mag worden ingenomen op de dagen erna. De maximale dagelijkse dosis is 5 mg eenmaal daags. De dosis die de symptomen voldoende verlicht, moet gedurende de kortste tijd worden ingenomen.

Het is belangrijk dat melatonine op het juiste moment wordt ingenomen. Als u de tablet op het verkeerde tijdstip inneemt, kan melatonine slaperigheid veroorzaken en aanpassing aan de lokale tijd vertragen. Daarom mogen de tabletten niet voor 20:00 uur en na 04:00 uur worden ingenomen. De tabletten moeten worden doorgeslikt met een glas water. Het advies is om niets te eten 2 uur vóór en in de 2 uur na het geplande moment van het innemen van melatonine.

Neem contact op met een arts als de symptomen binnen 6 dagen niet verbeteren of erger worden.

U kunt de tablet van 5 mg in gelijke doses verdelen.

Heeft u te veel van dit medicijn ingenomen?

Heeft u te veel van uw medicijn ingenomen of heeft een kind per ongeluk dit medicijn ingenomen? Neem dan altijd contact op met een arts of ziekenhuis voor een beoordeling van de risico's en voor nadere instructies.

U kunt slaperig worden als u meer dan de geadviseerde dagelijkse dosering heeft ingenomen.

Bent u vergeten dit medicijn in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit medicijn

Er zijn geen schadelijke effecten bekend als de behandeling onderbroken of voortijdig beëindigd wordt. Na voltooiing van de behandeling zal dit medicijn geen ontwenningsverschijnselen veroorzaken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen bij kortdurend gebruik voor het behandelen van jetlag zijn hoofdpijn, misselijkheid, verminderde eetlust, duizeligheid, slaperigheid overdag en desoriëntatie (in de war zijn).

Bij gebruik voor het behandelen van andere aandoeningen zijn uiteenlopende bijwerkingen van melatonine gemeld.

Krijgt u last van een van de onderstaande ernstige bijwerkingen? Dan moet u onmiddellijk stoppen met het innemen van het medicijn en contact opnemen met uw arts.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen):

- pijn op de borst.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 personen):

- bewusteloosheid of flauwvallen
- ernstige pijn op de borst als gevolg van angina pectoris
- uw hart voelen kloppen
- depressie
- minder goed kunnen zien
- in de war zijn (desoriëntatie)
- draaiduizeligheid
- aanwezigheid van bloed in de urine
- minder witte bloedcellen in het bloed
- minder bloedplaatjes in het bloed, wat de kans op bloedingen of blauwe plekken vergroot
- psoriasis (huidziekte waarbij u last heeft van een schilferende, rode en droge huid).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

- overgevoelighedsreactie
- zwelling van de huid.

Krijgt u last van een van de onderstaande niet-ernstige bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts en/of zoek medisch advies.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 personen):

Prikkelbaarheid, zenuwachtig zijn, rusteloosheid, slapeloosheid, abnormale dromen, nachtmerries, angst, migraine, hoofdpijn, lethargie (vermoeidheid, gebrek aan energie), rusteloosheid die samenhangt met een verhoogde activiteit, duizeligheid, vermoeidheid, hoge bloeddruk, buikpijn, spijsverteringsklachten, mondzweren, droge mond, misselijkheid, veranderingen in de samenstelling van uw bloed waardoor uw huid of uw oogwit geel kan worden, ontsteking van de huid, nachtzweeten, jeuk, huiduitslag, droge huid, pijn in armen en benen, uitscheiding van glucose in de urine, te veel eiwitten in de urine, symptomen van de overgang, gevoel van zwakte, afwijkende leverwerking en gewichtstoename.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 personen):

Gordelroos (vlekken en blaasjes op de huid met jeuk en pijn), hoge concentratie vetmoleculen in het bloed, veranderde stemming, agressie, zenuwachtig, onrustig of opgewonden zijn, huilen, stresssymptomen, vroeg in de ochtend wakker worden, meer zin in seks, depressieve stemming, geheugenstoornis, aandachtsstoornis, dromerige toestand, rusteloze benensyndroom, slechte slaapkwaliteit, een tintelend, prikkelend of ‘doof’ gevoel, waterige ogen, duizeligheid bij het gaan staan of zitten, opvliegers, zure oprispingen, maag-darmstoornis, blaarvorming in de mond, tongzweren, maagklachten, braken, abnormale darmgeluiden, winderigheid, te veel speeksel, slechte adem, vervelend gevoel in de buik, maagstoornis, ontsteking van het maagslijmvlies, eczeem, huiduitslag, ontsteking van de huid van de hand, jeukende huiduitslag, nagelstoornis, artritis, spierspasmen, nekpijn, nachtelijke krampen, grote hoeveelheden urine uitplassen, 's nachts moeten plassen, langer aanhoudende erectie die pijnlijk kan zijn, ontsteking van de prostaat, vermoeidheid, pijn, dorst, verhoogde leverenzymwaarden, afwijkende elektrolytengehaltes in het bloed en afwijkende laboratoriumtesten.

REVIEWED

By viola.wiegman at 11:40 am, Jun 26, 2024

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Zwelling van de mond of tong, melk/vocht druppelt uit de tepel.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt u ons om meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

5. Hoe bewaart u dit medicijn?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de doos (na EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

6. Inhoud van de verpakking en overige informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

- De werkzame stof in dit medicijn is melatonine.

Elk tablet van 3 mg bevat 3 mg melatonine.

Elk tablet van 5 mg bevat 5 mg melatonine.

- De andere stoffen in dit medicijn zijn: calciumwaterstoffsfaatdihydraat, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, watervrij colloïdaal silicumdioxide en voorverstijfseld zetmeel.

Hoe ziet Valdispert melatonine eruit en wat zit er in een verpakking?

3 mg tablet: witte, ronde, bolvormige tablet met het logo '7' en een diameter van 7 mm.

5 mg tablet: witte, capsulevormige tablet, met aan één zijde een breukstreep, met een afmeting van 10 mm x 5 mm. U kunt de tablet in gelijke doses verdelen.

Verpakkingen:

10 en 30 tabletten in blisterverpakkingen (PVC/Al) of in een tablettencontainer (container van HDPE-plastic en sluiting van LDPE-plastic).

Het is mogelijk dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder
Vemedia Manufacturing B.V.
Verrijn Stuartweg 60
1112 AX Diemen
Nederland

Fabrikant
Vitabalans Oy
Varastokatu 7-9
13500 Hämeenlinna
Finland

Voor correspondentie en inlichtingen
productNL@cooperconsumerhealth.com

In het register ingeschreven onder

Valdispert melatonine 3 mg tabletten: RVG 125556

Valdispert melatonine 5 mg tabletten: RVG 125558

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen

Finland: Melatonin Vemedia

Nederland: Valdispert melatonine

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2024.



little buddha

littlebuddhaagency.com

Date / Fecha: 19-06-24
Client / Cliente: COOPER
Version / Versión: V01
File / Archivo:
COD: VAL29_06_Medic_Melato 30_3-5mg_PIL_F6AB1
Software: Adobe® Illustrator + Photoshop
Colors in document / Colores en el documento: 1

P. 2758 c

PROFILE COLOR / PERFIL DE COLOR:
Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004)

Direct inks to be determined by printer /
Tintas directas a determinar por el impresor.
Color target last print run approved or provided by the client / Seguir la referencia de color, tiraje anterior aprobado - suministrado por el cliente.
Direct inks on images to be created by the printer or converter / Tintas directas de la imagen a crear por el impresor.

High Resolution Images /
Imágenes Alta Resolución

DieCut /
Plano de Impresión:

Measurement Unit / Unidad de Medida: mm
Scale / Escala: 1:1

OBSERVATIONS: The contents, technical specifications and facts of these artworks have been verified by Little Buddha Group S.L. and must be signed/approved by the client showing their control and agreement. Little Buddha Group S.L. therefore, accepts no responsibility for possible errors or involuntary omissions, nor for changes made deliberately by third parties or for any claims that may arise as a result of them. Furthermore, Little Buddha Group S.L. will accept no responsibility for print runs that have not previously been subjected to, jointly with the client, the minimum checked and signed controls (engraver's proofs on real material, range book, new contractual proofs, ...).

OBSERVACIONES: Los contenidos, especificaciones técnicas y textos de estos originales han sido verificados por Little Buddha Group S.L., y deberán estar firmados y/o aprobados por el cliente manifestando su control y conformidad. Por ello, Little Buddha Group S.L. no se hace responsable de posibles errores, omisiones involuntarias, tampoco por cambios realizados deliberadamente por terceros, ni de las reclamaciones que se pudieran derivar de ellas. Asimismo, Little Buddha Group S.L. no asumirá ninguna responsabilidad de aquellos tirajes en los que previamente no se hayan efectuado conjuntamente con el cliente, los mínimos controles (pruebas de galardon en material real y libro de gamas, nuevos pruebas contractuales, etc), revisados y firmados convenientemente.

NOTE: THE ATTACHED FONTS ARE TO BE UNDERSTOOD AS A SAMPLE. IN NO CASE THIS IS A TRANSFER OF FONTS.
NOTA: LAS TIPOGRAFÍAS ADJUNTAS SON A MODO INDICATIVO. EN NINGÚN CASO ES UNA TRANSFERENCIA NI ENTREGA DE TIPOGRAFÍAS.

NEEDS CHECKING THE EAN CODES PRINT BEFORE THEIR FINAL PRODUCTION FOR THE CORRECT VALIDATION OF THE SAME / PRECISO LA COMPROBACIÓN DE LOS CÓDIGOS EAN EN IMPRENTA ANTES DE SU PRODUCCIÓN FINAL PARA LA CORRECTA VALIDACIÓN DE LOS MISMOS.

BACKGROUND COLOR AND SPECIAL COLORS NEEDS FINAL EVALUATION ACCORDING TO PREVIOUS SCREENS OR PRINTED COLOR TEST / EL COLOR DE FONDO Y COLORES ESPECIALES NECESITAN LA VALIDACIÓN FINAL SEGÚN TIRAJES ANTERIORES O PRUEBA DE COLOR IMPRESA.